

FUNGI GALLICI

LECTI A CL. VIRIS

P. BRUNAUD, C. C. GILLET, ABB. LETENDRE, A. MALBRANCHE, J. THERRY

VEL EDITI

IN MYCOTHECA GALLICA CL. C. ROUMEGUÈRI *)

RECENSUIT

P. A. SACCARDO

SERIES III.

(Cfr. *Michelia* vol. II. p. 39, ubi siglorum explicationem invenies, quibus addenda sunt sigla **Lb.** quæ indicabunt Dominam A. LIBERT et territorium Malmediense (*Malmedy, Rhenogovia*) nec non littera **G.** quæ indicabit cl. C. C. GILLET et territorium Alentionense (*Alençon, Orne*). Litt. **R.**, more solito, indicabit cl. ROUMEGUÈRE et territorium Galliæ australioris. Numeri auctoribus adjuncti eorumdem collectionum numeris respondent).

Hymenomyceteæ

1091. **Agaricus** (*Mycena*) **corticola** Schum. f. **longipes**; stipite longiore et pilosiore. — In cortice querino, *Lyon*, Sept. 1880. **T.** (5194).
1092. **Agaricus** (*Clitocybe*) **Catinus** Fr. **F. G.** 510. — In horto botanico, *Clermont Ferrand*, Julio 1879, **LAMOTTE**.
- (379). **Agaricus** (*Clitocybe*) **laccatus** Scop. ***rufo-carneus** Fr. et ***amethystinus** (Bolt.) **F. G.** 701 et 601. — In sylvis *Meudon*, aut. 1879. **R.**

*) Interjecti sunt fungi nonnulli algerienses (cl. Doct. TRABUT) et helvetici (cl. Doct. MORTIER).

1093. **Agaricus** (Naucoria) **pediades** Fr. In umbrosis
prés Lyon. **R.** (202).
1094. **Hygrophorus** (Hygrocybe) **conicus** (Scop.) Fr.
In sabulosis *Agny*, *Rhône*. **R.**
1095. **Cantharellus muscigenus** (Bull.) Fr. **F.** **G.**
707. In muscis majoribus legit DESMAZIERES.
1096. **Polyporus adustus** (W.) Fr. In truncis **L.**
(1362). **R.** (237).
1097. **Polyporus albus** Fr. In assere putri in umbrosis
R. (388).
1098. **Polyporus perennis** Fr. **F.** **G.** 702. In erice-
tis *Autun*, X. GILLOT.
1099. **Caldesiella ferruginea** (Fr.) Sacc. *Hydnum fer-
ruginosum* Fr. Hymn. 613, Cooke Hndb. I. 299. —
In sabulosis subnudis *bord du canal vers Bagnols*
(*Gard*), Oct. 1880. **T.** (5257). — Subiculi cinnamo-
mei hyphæ filiformes subramosæ, 2-3 micr. d.; sporæ
globosæ 8-9 micr. d. eximie aculeatæ, olivaceo-fuligineæ.
(388). **Troglia crispa** (Pers.) Fr. **F.** **G.** 602. Ad ra-
mos *Betulae* **M.**
1100. **Solenia anomala** (Per.) Fr. **F.** **G.** 773. (*Peziza*)
In ligno pineo *Vosges* **M.** — ad ramos fagineos
Mb. (150).
1101. **Solenia poriæformis** (DC.) Fuck. Symb. I. Na-
chtr. p. 2. — Ad ligna putrida *Tiliae* **Mb.** (153 et
170). — Basidia subgyriniformia 20-26 = 8-9, granulo-
sa, hyalina. *Porothelium Friesii* Mont. affine videtur.
1102. **Cyphella cinereo-fusca** (Schw.) Sacc. *Peziza ci-
nereo-fusca* Schw. — In sarmenis *Vitis viniferæ*
R. (306).
1103. **Cyphella Monacha** Speg. **F.** **G.** 768. — In sar-
menis *Vitis viniferæ* *Toulouse* **R.** et *Conegliano*
SPEGAZZINI. — Specimina imperfecta, forte a *C. cine-
reo-fusca* non satis diversa.
1104. **Cyphella punctiformis** (Fr.) Karst. *stipitulata:
cupulis albis obconico-stipitellatis, pilis radiantibus can-
didis 200 = 5-6, rugulosis cinetis; basidiis tereti-cla-
vulatis, 15 = 3-4. — In foliis *Crataegi Oxyacan-*
thæ putridis *Francheville (Rhône)* **T.** (5234).

1105. **Cyphella Libertiana** Cooke Grev. 1880 p. 81.
C. villosa (P.) **F. G.** 604. In ramis Corni masculæ, *Malmedy*. **Lb.** — Præcipue exiguitate a *C. villosa* differre videtur.
1106. **Cyphella muscigena** (Pers.) Fr. Hymen. 663.
Thelephora vulgaris Pers. Myc. Eur. t. VII. fig. 6.
— In muscis majoribus in terram descendens, *Francheville, Lyon*, Oct. 1880. **T.** (5229). — Basidia in apice hypharum filiformium, tereti-clavulata. Forma plerumque stipitato-spathulata, candida.
1107. **Pistillaria maculicola** Fuck. **F. G.** 606. *Typhula hirsuta* Lib. — Ad folia decidua Pyri Mali *Malmedy*. **Lb.**
1108. **Pistillaria ramealis** Lib. **F. G.** 605 (*Typhula*)
In cortice Syringæ et Rubi. **Lb.**
1109. **Typhula Laschii** Rabh. **F. G.** 714. In sarmen-tis *Vitis*, *Toulouse*, hieme 1879. **R.**
1110. **Clavaria argillacea** Fr. **C. flavipes* Per. **F. G.**
710. In sylvaticis. **M.**
1111. **Clavaria rugosa** Bull. **F. G.** 711. In sylvaticis (DESMAZIERES). **M.**
1112. **Clavaria cristata** Holmsk. In sylvis quercinis **R.** (201).
1113. **Clavaria fastigiata** L. **F. G.** 708. In pratis (DESMAZIERES). **M.**
1114. **Clavaria formosa** Pers. **F. G.** 709. In sylvis, autumno. **M.**
1115. **Corticium Typhæ** Fuck., Cooke Grev. 1880 p. 81.
C. lacteum. **F. G.** 603. — Ad folia Scirpi syl-vatici. **Lb.**
1116. **Corticium cœruleum** Fr. **F. G.** 505. In lignis, *Toulouse*. **R.**
1117. **Corticium nudum** Fr. **F. G.** 706. In truncis Tremulæ, *Bruyeres* A. MOUGEOT.
1118. **Stereum frustulosum** Fr. **concavum*. **F. G.**
703. In quercu *Toulouse*. **R.**
1119. **Thelephora sebacea** Pers. In frustulis et mu-scis vivis. **T.** (4175).
1120. **Aleurodiscus amorphus** (Pers.) Rabh. *Corti-*

- cium Ookesii* B. & C. **F. G.** 705. — In cortice *A-bietis pectinatae*. **M.** — Veræ endosporæ matu-ræ a nemine observatæ; quare sic dicti asci nil nisi basidia videntur.
1121. **Auricularia sambucina** Mart. *Hirneola Auri-cula-Judæ* (Fr.) Berk. **F. G.** 507. In truncis Sam-buci. **M.**, *Ailanthi*. **R.** (142).
1122. **Tremella moriformis** Berk. In cortice *Ailan-thi*. **G.** (20).
1123. **Tremella crypta** Lib. **F. G.** 608. (*T. unicolor*) — Ad cortices. **Lb.** — A *T. unicolo*re Fr. satis dif-ferre videtur.
- (427). **Epidochium atrovirens** Fr. *Tremella Genistæ* Lib. **F. G.** 607. *T. exigua* Desm. *Exidia minutula* Sacc. *Næmatelia virescens* Corda, Cooke Grev. 1880 p. 82, nec Fries sec. cit. tab. 1857 fig. 1 Floræ da-nicæ, quæ diversam rem sistit. — In ramis *Saro-thamni*. **Lb.**
1124. **Epidochium albescens** Sacc. & Malbr. Conce-ptaculis superficialibus, gregariis, convexo—pulvinatis, siccis depresso, $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ mill. diam., gelatinosis, fumoso-hyalinis nitidulis; basidiis flocciformibus prælongis, 100—120 × 2, simplicibus, ramosisque, dense fascicu-latis, hyalinis, guttulatis, apice in sporophora (pseu-dosporas) e globoso ellipsoidea, 12—14 × 9—12, granulosa, e hyalino lutescentia desinentibus; sporis..... non visis. — In caulibus emortuis *Rumicum*, **Mb.** (175). — Ab *Ep. atrovirenti* colore, exiguitate et situ mox dignoscendum.

Lycoperdaceæ

1125. **Scleroderma vulgare** Fr. **F. G.** 715. In eri-cetis. **M.**
1126. **Geaster fimbriatus** Fries. **F. G.** 510. In pi-netis. **M.**
1127. **Geaster hygrometricus** Fr. **F. G.** 509. In sa-bulosis sylvaticis. **M.**

Hypodermeæ

1128. **Entyloma Ranunculi** (Bon.) Schröt. In foliis Ranunculi auricomi. **L.** (1368). **R.** Ficariae et R. lanuginosi. **R.** (126-173). — Sporæ globulosæ, leves, 10-11 micr. d., pallide ochraceæ.
1129. **Entyloma Linariæ** Schröt. Bemerk. und. Beob. 371. — In foliis Linariæ vulgaris. **L.** (1342). — Sporæ globulosæ, 10 micr. d., leves, episporio luteolo 2 micr. d., intus albæ.
1130. **Entyloma fuscellum** Schröt. in Rabh. F. E. n. 2495. f. **Glaucii lutei**. — In ejusdem foliis **L.** (1402). — Sporæ e globoso angulosæ 15-16 micr. d. vel 15-13, ochraceæ, episporio 1 micr. cr. saturate ochraceo, endosporio $1\frac{1}{2}$ micr. cr. pallidiore, intus granulosæ. *Cylindrosporium*, etsi senio collapsum, notavi.
1131. **Polycystis Anemones** (Pers.) Schröt. f. **Ranunculi**. **F.** **G.** 617. — In ejusdem foliis (DESMAZIERES). **M.**
1132. **Polycystis Violæ** (Sow.) Berk. In petiolis Violæ odoratæ &c. raro. **R.** (20).
1133. **Puccinia Primulæ** (DC.) Duby. In foliis Primulæ grandifloræ. **R.** (113). — Teleutospores minutæ, didymæ 22-24 + 16, breve stipitatæ, pallide cinnamomeæ, vertice rotundatae.
1134. **Puccinia Bistortæ** DC. In foliis Polygoni Bistortæ. **R.** (160). — Uredosporæ globulosæ v. ovoideæ 20-23 micr. d., pallide ochraceæ, leves; teleutospores ellipsoideæ, constricto-didymæ, 25 + 18, brevissime stipitatæ, leves sed intus granulatæ, cinnamomeæ.
1135. **Puccinia Veratri** Duby. — In foliis Veratri **R.** (163). — Teleutospores ex ovato deorsum cuneatæ, 35-40 + 16-17, vertice rotundatae, asperulæ, cinnamomeæ, hyalino-stipitatæ.
1136. **Puccinia Caricis** Rob. — In foliis Caricis hirtæ. **R.** (151) socia *Darluca Filo*.
1137. **Puccinia Discoidearum** Link. f. **Absinthii**. **F.** **G.** 742. — In ejusdem foliis legit MIRBEL. **M.** (Nutrix videtur *Artemisia pontica*).

1138. **Puccinia Gladioli** Cast. In foliis *Gladioli* communis. **R.** (3). — Teleutosporæ ovato-oblongæ, 38 - 20, tunica apice obtusiuscula incrassata, cinnamomeæ, leves, longiuscule hyalino-stipitatæ.
1139. **Puccinia Polygonorum** Schl. In foliis *Polygoni dumetorum*. **R.** (21).
1140. **Puccinia Smyrnii** Biv. Bern. **F. G.** 525. — In foliis *Smyrnii Olusatri*, *Perpignan*, legit O. DEBEAUX.
1141. **Puccinia Trabutii** Roum. & Sacc. Acervulis erumpentibus compactis, 5-6 cent. longis, atrocinnamomeis; teleutosporis oblongo-didymis, utrinque rotundatis, 45-50 - 25, vertice vix incrassatis, medio modice constrictis, guttulatis, cinnamomeis, stipite filiformi prælongo, 110-120 - 5, hyalino; uredosporis non visis. — In culmis *Phragmitis giganteæ*, prope nodos, *in Algeria*, Junio 1880, TRABUT, cui species merito dicata. Toto habitu et loco a *Pucc. Phragmitis* et *Pucc. Magnusiana* distinguendā.
1142. **Puccinia Glechomæ** DC. **F. G.** 620. In foliis *Glechomæ hederaceæ*, *Lozère*, PROST. **M.**
1143. **Puccinia Ribis** DC. **F. G.** 621. In foliis *Ribis rubri*, *Lozère*, PROST.
1144. **Puccinia Gentianæ** Link. **F. G.** 619. In foliis *Gentianæ ciliatæ*, *Lozère*, PROST. **M.**
1145. **Puccinia Pimpinellæ** Link. f. *Chærophylli*. In foliis *Chærophylli temuli*. **L.** (1353).
1146. **Puccinia Asphodeli** (DC.) Duby, Bagnis Monogr. Pucc. t. IV. fig. 135. *Uredo Asphodeli* DC. Fl. fr. VI. p. 70. — In foliis *Asphodeli cerasiferi près Barbantane* (*Bouches du Rhône*) legit 23 Majo 1880 TH. DELACOUR. — Teleutosporæ maximæ, ellipsoideæ, utrinque rotundatae, 50-55 - 40-42, constricto-didymæ, cinnamomeæ, sed circulo hyalino non constricto obvolutæ, brevissime crasseque stipitatæ; uredosporæ globosæ 45 micr. d. tenuissime granulosæ, dilute flavidæ. — Species prædictincta!
1147. **Puccinia Geranii** Corda. **F. G.** 616 (Uredosp.: *Trichobasis Geranii* Berk.). In foliis *Geraniorum sylvestrium*, *Lozère*, PROST. **M.**

1148. **Uromyces Scrophulariæ** (DC.). — In foliis Scrophulariæ nodosæ. **R.** (166). — Teleutosporæ pyriformes, vertice obtuse papillatæ, 25 ~ 16, cinnamomeæ, stipite tereti, 20 ~ 5, hyalino fultæ.
1149. **Uromyces Laburni** (DC.) Fuck. **F. G.** 622. (*Uredo Cytisi* DC.). In foliis Cytisi, *Lozère*, PROST. **M.**
1150. **Uromyces Anagyridis** Roum, **F. G.** 743. In foliis Anagyridis foetidæ, *Collioure*, in horto NAUDIN, Oct. 1879. — Teleutosporæ e globoso ellipsoideæ, 25 ~ 18, eximie tuberculatæ, cinnamomeæ, stipite tereti, 6–8 longo, hyalino fultæ: uredosporæ globosæ magnæ 26–27 micr. d. flavidæ, leves. Affinis *Uromyceti Lupini* Sacc. et *Ur. Galegae* Sacc., sed satis diversus.
1151. **Uromyces Dactylidis** Otth. In foliis Avenæ fatuæ. **R.** (273).
1152. **Pileolaria Terebinthi** Cast. **F. G.** 747. In foliis Pistaciæ Terebinthi, *Collioure*, Oct. 1879.
1153. **Cronartium asclepiadeum** Fries. **F. G.** 549. In foliis Cynanchi Vincetoxicici. **M.**
1154. **Cronartium flaccidum** (A. S.) Wint. Hedw. 1880 p. 55. *Sphaeria flaccida* A. S. **F. G.** 577. — In foliis Pæoniæ officinalis. **M.**
1155. **Coleosporium Campanulacearum** (Pers.) Fr. In foliis Campanulæ Trachelii. **R.** (5).
1156. **Melampsora Caprearum** (Lév.) Thuem. **F. G.** 624. (*M. salicina*). In foliis Salicis Capréæ, *Lozère*, PROST. **M.**
1157. **Melampsora Epilobii** (Pers.) Fuck. **F. G.** 744. In foliis Epilobii rosei, près Valleyres, W. BERBEY.
1158. **Melampsora Circææ** (Schum.). In foliis Circææ lutetianæ. **L.** (1354^{bis}). — Uredosporæ globuloso-inæquales, 15–16 ~ 10–12, flavidæ.
1159. **Melampsora Carpini** (Nees) Fuck. In foliis Carpini Betuli. **R.** (114).
1160. **Melampsora Quercus** (Brond.) Schröt. In foliis quercinæ. **R.** (192).
1161. **Æcidium Scrophulariæ** DC. In foliis Scrophulariæ nodosæ, socio *Uromycete*. **R.** (166).

1162. *Æcidium Tussilaginis* Gm. f. *Adenostylis bifrontis*. In ejusdem foliis, ad pag. inf. **R.** (161).
1163. *Æcidium Aquilegiæ* Pers. **F. G.** 751. In foliis *Aquilegiæ vulgaris*, *Toulouse*, rarius, aestatae 1879. **R.**
1164. *Æcidium Clematidis* DC. **F. G.** 752. In foliis petiolisque *Clematidis Vitalbae*, *Lozère*, PROST. **M.**
1165. *Peridermium Pini* (Willd.) Wallr. f. *acicola*. In foliis *Pini sylvestris*. **G.** (10).
1166. *Ceratitium laceratum* (Sow.) Rabh. **carpophilum*. **F. G.** 749. In fructibus *Cratægi Oxyacanthæ*, *Perpignan*, Junio 1879, O. DEBEAUX.
1167. *Acalyptospora?* *nervisequia* Desm. **F. G.** 617 et 639. In foliis *Ulmorum*, DESMAZIERES, ROUSSEL. **M.**

Phycomyceteæ

1168. *Protomyces macrosporus* Ung. In petiolis nervis que foliorum *Ægopodii Podagrariæ*, *Francheville près Lyon*. **T.** (74-75). — Sporæ magnæ e globoso ellipsoideæ, 60-70 × 60, ochraceæ, exosporio $3\frac{1}{2}$ micr. d., endosporio 4 micr. d., intus granulosæ.
- (480). *Cystopus Bliti* (Biv.) de Bary. In foliis *Amaranthi Bliti*, *Lyon*. **T.** (5181-5182). — Oogonia sphærica 65 micr. d., ochracea; oosporæ sphæricæ 55 micr. d. eximie elevato-areolatæ, areolæ 6-7 micr. d., flavo-fuligineæ.
1169. *Peronospora nivea* (Ung.) de Bary. In foliis *Pastinacæ sativæ*. **R.** (53).
1170. *Peronospora viticola* Berk. In foliis *Vitis viniferae*, *Saintes*. **B.**
1171. *Peronospora grisea* Ung. In foliis *Veronicae hederæfoliæ*. **L.** (1367).

Pyrenomyceteæ

ERYSIPHEÆ

1172. **Microsphæra Astragali** (DC.) Trev. In foliis
Astragali glycyphyllici. **R.** (6).
1173. **Microsphæra Ehrenbergii** Lév. *Calocladia di-*
varicata var. **F. G.** 767. In foliis *Lonicerae* ta-
tariæ, DESMAZIERES. **M.**
1174. **Microsphæra Lycii** (Lasch.) Sacc. & Roum. —
M. Mougeotii Lév. (1851). *Erysiphe Lycii* Lasch.
 (1850). — In foliis *Lycii europæi*, *Lyon* (stat.
 conid. *Oidium Lycii* socio *Cicinnobolo Cesatii* de Ba-
 ry). **R.** (67).
1175. **Erysiphe tortilis** (Link.) Lév. In foliis *Corni*
sanguineæ. **R.** (222).
1176. **Erysiphe Montagnei** Lév. **F. G.** 533. In fo-
 liis *Lappæ tomentosæ*, *Toulouse*. **R.**
1177. **Erysiphe graminis** DC. **F. G.** 766. — In fo-
 liis *Agropyri* et *Agrostis*, *Paris*, *LÉVEILLE*, et
 in foliis *Avenæ sativæ*. **R.**
1178. **Erysiphe horridula** Lév. In foliis *Borraginis*
officinalis (Conidia). **B.**
1179. **Erysiphe?** *Rubi* Fuck. In foliis *Rubi fruti-*
cosi (Conidia). **L.** (1341).
1180. **Uncinula adunca** (Link.) Lév. In foliis *Salicis*
purpureæ. **R.** (215).

SPHÆRIACEÆ

Allantosporæ

- (63). **Valsa** (Euvalsa) **ambiens** (Pers.) Fr. f. *tetraspora*
Magnoliæ: asci 60 ~ 18; sporidia 20–25 ~ 6–7. **T.**
 (5355). — f. *octospora* *Corni*: asci 60 ~ 8; sporidia
 15 ~ 3–3½. **R.** (95). — f. *octospora* *Gleditschiæ*:
 asci 70 ~ 14; sporidia 20 ~ 4–5. **T.** (7932).
1181. **Valsa** (Euvalsa) **Abietis** Fr. **F. G.** 680. — In
 cortice *Abietis*. **Lb.**

1182. **Eutypella Prunastri** (Fr.) Sacc. **F. G.** 560. —
Ad ramos Pruni spinosæ. **M.**
- (493). **Eutypa heteracantha** Sacc. In ramis Platani orientalis. **R.** (122). — Ailanthi. **R.** (121). — Rhois. **R.** (40), socio plerumque *Graphio fasciculato* Sacc.
1183. **Eutypa Fraxini** Nitschke f. **Arbuti**. In ramis corticatis Arbuti Uredonis. **R.** (357). — Sporidia allantoidea, $9-11 \approx 1\frac{3}{4}-2$, dilute olivacea.
1184. **Diatrype bullata** (Hoffm.) Fr. **F. G.** 556. — Ad ramos Salicum. **M.**
1185. **Diatrype Daldiniana** DNtrs Recl. Pirenom. p. 481. — In ramis crassioribus corticatis Mori albæ. **R.** (54). — Acervuli eminentes, pulvinati, peridermio arcte cincti, aterrimi, verruculosi, $2\frac{1}{2}$ mill. d. Asci tereti-clavati, stipitati, apice truncati p. s. $50 \approx 8$; sporidia disticha, allantoidea, $12-15 \approx 2\frac{1}{4}$, flava.
1186. **Diatrypella favacea** (Fr.) Ces. DNtrs. — In cortice Betulæ albæ. **R.** (236). — Asci tereti-clavati p. s. $60-70 \approx 10-12$, myriospori; sporidia botuliformia, $5-6\frac{1}{2} \approx 1-1\frac{1}{4}$, dilute olivacea.
1187. **Cryptosphæria millepunctata** Grev. In cortice Populi albæ. **R.** (118). — Asci longe stipitati, clavati, p. s. $50 \approx 6$; sporidia octona, allantoidea, $10-11 \approx 2\frac{1}{2}$, pallide olivacea.

Hyalosporæ

1188. **Apiospora Striola** (Pass.) Sacc. In culmo putri Bambusæ, Lyon. **R.** (145).
1189. **Apiospora Punctum** S. & S. In foliis putridis Bambusæ, Lyon. **R.** (146).
- (71). **Phomatospora Berkeleyi** Sacc. f. **Scirpi lacustris**. In ejusdem calamis. **T.** (4885). — Asci breve stipitati $80-90 \approx 3\frac{1}{2}-4$; sporidia tereti-ellipsoidea, $7 \approx 3$, 2-guttata, hyalina.
1190. **Botryosphæria Bérengeriana** DNtrs. — In cortice Platani occidentalis. **R.** (120).
1191. **Physalospora Festucæ** (Lib.) Sacc. In foliis

- Festucæ, Sept. 1879. **Mb.** (143). — Ascii 100 ~ 17; sporidia disticha, ovoidea 30 ~ 10.
1192. **Physalospora Claræ-bonæ** Speg. **F. G.** 673. — In foliis exsiccatis Vaccinii Vitis-idaeæ. **Lb.**
1193. **Apiosporium Salicis** Kunze var. *populinum*. — In ligno decorticato Populi. **T.** (4678). — Celulæ peritheciæ interiores (asci immaturi?) globulosæ, 7-8 micr. d., nucleatæ, hyalinæ.
1194. **Gnomonia amoëna** (Nees) Fuck. **F. G.** 568 (*Sphaeria*). — In petiolis foliorum Coryli Avellanæ. **M.**
1195. **Gnomonia vulgaris** DNtrs. — In foliis Coryli Avellanæ. **L.** (1325).
1196. **Gnomonia melanostyla** (DC.) Fuck. — In foliis languidis Tiliæ europeæ, *Lozère*, PROST. **M.**
1197. **Gnomonia Euphorbiæ** (Fuck.) Sacc. *Sphaeria Euphorbia* Fuck. Enum. Fung. Nass. 118 t. I. fig. 23. — In caulibus Euphorbiæ verrucosæ in Monte *Jura*, Majo 1880, MORTHIER. — Ascii tereti-clavati, deorsum attenuati, apice 2-foveolati truncatique, 90 ~ 20; sporidia disticha, breve fusoidea inaequilateralia, 20 ~ 8, 2-4-guttata, hyalina. A *Gnom. devexa* præcipue sporiis duplo crassioribus differt.

Obs. Gnomoniæ genus epicrisi nova eget et saltem in genera duo dividendum videtur, nempe unum (*Gnomonia*) didymosporum, alterum (*Gnomoniella*) amerosporum, seu sporiis vere continuis instructum. Quoad *Gnomoniam polysporam* Auersw. ascis polysporis præditam, hæc cum *Ditopella* confluit. *Cryptoderis* Auersw. species Gnomoniæ phragmosporas optime separat colligitque.

Phæosporæ

1198. **Cephalotheca reniformis** Sacc. & Th. Peritheciis gregariis inter fibras corticales nidulantibus v. denique superficialibus, globosis, astomis, sed vertice quandoque papillatis, denique sæpe collabascendo cupulatis fusco-nigricantibus, $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{4}$ mill. d., initio ubique pilis filiformibus fuligineis, longis, 2 micr. d. vestitis, dein calvescientibus, basique tantum vestitis, contextu

crassiusculo, minute parenchymatico, fusco; ascis globosis v. ellipsoideis 10 micr. d., vel 15 ~ 14-12, cito diffluentibus, octosporis; sporidiis conglobatis reniformibus, 4-5 ~ 3-3 $\frac{1}{2}$, initio olivaceis dein dilute fuligineis. — In laminis librosis Populi putrescentis, Lyon, Majo 1880. T. (4981). — A ceteris speciebus ob sporidia reniformia minuta mox dignoscitur.

1199. **Chætomium chartarum** Ehrenb. In charta bibula putri, socia *Stachybotryte lobulata* Berk. — Pili peritheciis simplices, 2-3 micr. cr., dilute fuliginei asperuli; sporidia limoniiformia, 8 ~ 6, 1-guttata, fuliginea.

1200. **Ceratostoma Therryanum** R. & S. Rev. Mycol. 1880, p. 188. — Peritheciis superficialibus sparsis v. subgregariis, globoso-conicis, $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ mill. d., atris, subcoriaceis, in ostiolum filiforme subæquilonatum productis; contextu distincte parenchymatico, rufo-ochraceo; ascis.....; sporidiis ellipsoideis utrinque obtuse rotundatis, 15 ~ 7-8, fuligineis. — In cortice Platani orientalis, socio *Nematogonio aurantiaco*, Lyon, THERRY. R. (234).

1201. **Ceratostoma?** piliferum Fr. F. G. 685. — In ligno pineo putri, Strasbourg. M.

1202. **Anthostomella appendiculosa** (B. & Br.) Sacc. *Sphaeria clypeata* Moug., nec Nees, F. G. 574. — In sarmentis Ruborum, DE LACROIX. M.

1203. **Anthostomella mirabilis** Speg. in Rev. Mycol. 1880 p. 29 nota 4. F. G. 783. — In foliis putridis Ananassæ, Toulouse, aut. 1879. R. — Perithecia globosa subcarbonacea, atra, parenchymati immersa ostilo papillulato exerto donata, 180-200 micr. d.; asci cito diffluentes; sporidia elliptico-sublimoniiformia e latere compressa curvula, fuliginea, utrinque apiculo hemisphaerico, hyalino aucta, strato mucoso obvoluta, saepe uni-guttata, 15 ~ 5 $\frac{1}{2}$ -6, e latere 3 $\frac{1}{2}$ -4 cr.

1204. **Anthostomella contaminans** (Dur. & Mont.) Sacc. In costa foliorum Chamæropis putrescentis, in *Algeria*, A. TRABUT. R. (255 A). — Asci tereti-clavati, apice rotundati breve stipitati, 90-110 ~ 10, octospori; sporidia monosticha, oblongo-ellipsoidea, 15-18

- ✓ 6-7, olivacea, dein atrofusca, initio strato hyalino obvoluta.
1205. **Anthostoma gastrinum** (Fr.) Sacc. In trunco corticato Mori putri. **R.** (248).
1206. **Anthostoma Xylostei** (Pers.) Sacc. In ramis corticatis Xylostei. **R.** (125 A. C.) — Sporidia globoso-ellipsoidea, 15-16 × 11-12, fuliginea.
1207. **Rosellinia thelena** (Fr.) Rabh. — In cortice pineo. **T.** (4726). — Ascii cylindrici p. s. 120-130
✓ 10; sporidia oblique monosticha, fusoidea, curvula, 25
✓ 7-8, fuliginea, utrinque acutiuscula setulaque 8-10 micr. longâ, hyalinâ aucta. Ab hac vix differt *R. andurnensis* (Ces.) DNtrs.
1208. **Rosellinia Tassiana** DNtrs. Sfer. ital. 19 t. XVI. In ramis corticatis Pruni spinosæ. **B.** (169). — Nobis est forma peritheciis sessilibus, ceterum extus verruculosis, pachydermaticis, stratoque interno albido instructis. Sporidia subovoidea, utrinque acutiuscula, 25-30 × 14-15, atra.
1209. **Poronia punctata** (L.) Fr. **F. G.** 566. In fimo equino in *Alsatia*, BUCHINGER. **M.**
1210. **Thamnomyces hippotrichoides** (Web.) Ehrenb. **F. G.** 782 (cum peritheciis!). — In cellis humidis *Toulouse* **R.** G. BAINIER. — Sec. Roum. *Th. Simonini* est status infans. Huc quoque spectare videtur **T.** (4963) in cortice pineo.
1211. **Xylaria filiformis** (A. S.) Fr. In foliis putridis et corticibus nec non in chorda putri, ubique sterilis. **T.** (4949, 4893).
1212. **Xylaria polymorpha** (Pers.) Grev. **F. G.** 666. In ligno pineo putri. **M.**, ad caudicem Araucariæ in Horto botanico, Lyon. **T.** (4989).

Didymosporæ

1213. **Gibbera Vaccinii** (Sow.) Fr. **F. G.** 565 et 689 (*Sphaeria cytisporea*). — In caulibus petiolisque Vaccinii Vitis idææ. **M.** — Setulæ peritheciis cuspidatæ, deorsum incrassatae, 60-70 × 6-7, aterrimæ; asci terc-

tes 90 ~ 8-9; breve stipitati, octospori; sporidia monosticha, oblongo-ellipsoidea 15-16 ~ 7-8, 1-septata, non constricta, dilute olivacea.

1214. **Venturia ilicicola** Cooke. **F. G.** 679. — In foliis Ilicis balearicæ. **Lb.**

1215. **Venturia bryophila** (Fuck.) Sacc. *Stigmataea (Cleroëa) bryophila* Fuck. In foliis Jungermanniæ emortuis, *S. Bonnet-le-froids, Rhône*, Apr. 1880. **T.** (4703) — Perithecia globulosa, superficialia, 120-130, micr. d., contextu parenchymatico, fusco, setulis filiformibus, basi leniter incrassatis 20-30 ~ 2, fuligineis laxe vestita; asci clavati, apice tunica integra rotundati, brevissime stipitati, 50-55 ~ 15, octospori, aparaphysati; sporidia disticha vel subtristicha ellipsoideo-oblonga, 15 ~ 6 $\frac{1}{2}$ -7 $\frac{1}{2}$, 2-guttata, denique 1-septata, non constricta hyalina.

1216. **Venturia chlorospora** (Ces.) Karst. Ad folia Pyri communis emortua. **Mb.** (142). — Est forma peritheciis parcus setulosis et sporidiis obscurioribus; asci 65-70 ~ 10-12; sporidia 15 ~ 5 $\frac{1}{2}$ -6, atro-olivacea; peritheciis setulæ 20-30 ~ 4, basi incrassatae.

1217. **Sphaerella punctiformis** (Pers.) Fuck. In foliis quercinis putridis. **R.** 158.

1218. **Sphaerella Cruciferarum** (Fr.) Sacc. **F. G.** 572. In caulinis Lepidii graminifolii. **R.** et in caulinis siliisque Erysimi. **R.** (377). — Perithecia globoso-depressa 70-80 micr. d., poro pertusa; asci clavati, breve crasseque stipitati 40-12; sporidia octona disticha oblongo-fusoidea, utrinque obtusiuscula, 15 ~ 3 $\frac{1}{2}$, 1-septata, leniter constricta, curvula 2-4-guttulata, hyalina.

1219. **Sphaerella Clymenia** Sacc. In foliis Lonicerae Caprifolii. **B.** (141).

1220. **Sphaerella? Caprifoliorum** (Desm.) Sacc. **F. G.** 786 (*Sphaeria*). — Ad folia Lonicerae Xylostei, DESMAZIERES. **M.** — Fructificatio ignota.

1221. **Sphaerella? corylaria** (Wallr.) Fuck. **F. G.** 678. — In foliis languidis Coryli Avellanæ. **Lb.** — Fructificatio ignota.

1222. **Arthopyrenia analepta** (Ach.) Körb., Michel. II. 248. *Amphisphaeria ericeti* S. & S. Mich. II. 58. *Sphaeria Barbieri* West. (teste Malbranche). — In trunco ramisque Ericæ vulgaris, *Brionne*. **Mb.** (168). *Amphisphaeria ericeti* S. & S. Fungi ital. 321 forma est maxime evoluta *Arthopyreniae analeptæ*, quæ revera mire ludit magnitudine peritheciorum atque sporidiorum.
1223. **Didymella? hyporhodia** Sacc. Peritheciis dense gregariis globoso-lenticularibus, epidermide velatis, lignique superficie cinnabarinæ factæ adnatis, 200 micr. d., poro pertusis; ascis tereti-clavatis 60 ~ 10, paraphysatis, sporidiis (immaturis) oblongis, hyalinis. — In caule Umbelliferarum majorum. **Mb.** (115). — Etsi immatura, ideoque incerta species, ob matricis characterem insignem notanda visa est.
1224. **Didymella? caulincola** Moug. **F. G.** 573 (*Sphaeria*). — In caulis Dipsaci sylvestris in *Alsacia*, **CASPARY**. **M.** — Fructificatio immatura, tamen *Didymellæ* species videtur.
1225. **Didymella superflua** (Auersw.) Sacc. In caulis Umbelliferarum **Mb.** (105).
1226. **Didymella Hyphenis** (Cooke) Sacc. & Roum. *Sphaeria Hyphenis* Cooke Handb. p. 895. In stipitibus Pteridis aquilinæ, *Algeria*, Julio 1880, Doct. TRABUT. — Asci obclavati 70–80 ~ 25, sporidia oblongo-clavulata 20–22 ~ 6, uniseptata, hyalina (non vere ellipsoidea ut ea quæ descriptsit cl. Cooke).
1227. **Didymosphaeria Galiorum** Fuck. (nec Desm.). In caulis Galii Aparines. **Mb.** (114).
1228. **Didymosphaeria conoidea** Niessl. In caule Lythri Salicariæ. **B.** (J.)
1229. **Amphisphaeria opulenta** DNtrs. **F. G.** 582 (*Sphaeria*). In ramis Opuntiæ vulgaris emortuis, *Collioure*. **R.**
1230. **Amphisphaeria Petrucciana** Cald. & DNtrs. In cortice putrescente quercino. **R.** (78). — Asci cylindrici breve stipitati, apice rotundati, paraphysibus filiformibus obvallati, 150–160 ~ 16–18, octospori jodo non cœrulecentes; sporidia monosticha, ellipsoidea,

utrinque obtuse rotundata, 18–20 × 11–12, 1-septata, non constricta, hyalina.

1231. **Diaporthe** (Sclerostr.) **oncostoma** (Duby) Fuck.
In ramis corticatis Robiniae Pseudacaciae. **T.**
(4817), **R.** (132).

1232. **Diaporthe** (Sclerostr.) **salicella** (Fr.) Sacc. In ramis corticatis Salicis vitellinæ. **Mb.** (91). — Asci subfusoidei, 64 × 14–15, subsessiles; sporidia disticha v. oblique monosticha oblongo-fusoidea, 18–20 × 5–6, utrinque obtusiuscula, curvula, 1-septata, ad septum lenissime annulato-tumidula, hyalina. Characteres citati cum *Sphaeria sphingiophora* Oud. Mat. Myc. Néer. I. p. 64 pl. VII. fig. II. (in Corno) congruunt, sed fungillus meus a *D. salicella* typica non satis differt, ut separari mereatur.

1233. **Diaporthe** (Tetrast.) **seposita** Sacc. *Sphaeria Wisteriae* Grogn. **F. G.** 586. — In ramis Wisteriae sinensis. **R.**

1234. **Diaporthe** (Tetrast.) **incarcerata** (B. & Br.) Nitschke Pyr. 298. — In ramis emortuis Rosæ caninæ. **B.** (166). — Asci fusoidei, 70 × 8–9; sporidia tereti-fusoidea, utrinque obtusiuscula, 15–16 × 4, 4-guttata, hyalina.

1235. **Diaporthe** (Euporthe) **occulta** (Fuck.) Nitschke. **F. G.** 669. — Ad squamas strobilorum Abietis excelsæ. **Lb.**

1236. **Diaporthe** (Euporthe) **nigrella** (Auersw.) Niessl. In caulis emortuis Eryngii campestris. **B.** (168). — Matrix late atro-purpureo-maculata. Ostiola parum extantia, acutiuscula. Asci tereti-clavati, 45–50 × 5 $\frac{1}{2}$ –6, octospori; sporidia disticha, oblongo-fusoidea, utrinque acutiuscula, 10–11 × 3–3 $\frac{1}{2}$, ut plurimum 3-guttata, non constricta, hyalina. — Cfr. Mich. II. 250.

Phragmosporæ

1237. **Leptosphaeria** **Ophiopogonis** Sacc. Fung. ital. n. 510. In foliis graminum putrescentium. **Mb.** (166. B.). — Etsi nutrix aliena, species non differt.

- Asci 40 ~ 8; sporidia fusoidea utrinque obtusiuscula, saepe inaequilateralia, 13–14 ~ 3 $\frac{1}{2}$, 3-septata, ad septum medium leniter constricta, dilute olivacea.
1238. **Leptosphaeria Galiorum** Sacc. f. **Cirsiorum**. In caulibus *Cirsii palustris*. **Mb.** (158). — Vix differt a typo.
1239. **Leptosphaeria obesula** Sacc. Peritheciis laxe gregarii subcutaneo-crumpentibus, globoso-depressis, obtuse papillatis, 100–140 micr. d., contextu parenchymatico fuligineo; ascis crasse clavatis, apice late rotundatis, 55–60 ~ 25, deorsum acutatis brevissimeque stipitatis, octosporis; sporidiis tristichis, fusoideo-clavulatis, 25–28 ~ 6, olivaceo-melleis, 3-septatis, medio constrictis utrinque obtusiusculis loculis inferioribus paulo angustioribus. — In caulibus herbarum majorum, *Elbeuf*. **Mb.** (139). — Præcipue ascis ratione longitudinis ad modum crassis statim dignoscenda species.
1240. **Leptosphaeria Doliolum** (Pers.) C. DNtrs. ***pa-chyspora**: sporidiis quam in typo crassioribus, nempe 25–28 ~ 5 $\frac{1}{2}$ –6 $\frac{1}{2}$, pallide fuligineis; ascis 110 ~ 10 12. — In caulibus *Adonis pyrenaicae*. **G.** (16).
1241. **Leptosphaeria Debeauxii** Sacc. & Roum. Peritheciis gregariis punctiformibus, globosis, $\frac{1}{6}$ mill. d., semi-immersis, nigris, nitidulis, ostiolo perexiguo; contextu densiusculo fuligineo; ascis cylindraceo-clavatis, 80 ~ 15, paraphysibus filiformibus raro furcatis obvallatis, 8-sporis; sporidiis distichis oblongo-fusoides, rectis curvulisve, medio subconstrictis, utrinque obtusiusculis, 20 ~ 6, 5–6-nucleatis, spurieque septatis, hyalinis. — In costa foliorum *Chamaeropis humilis* circa *Oran* in Algeria, Majo 1880, Od. DEBEAUX, cui species merito dicata.
1242. **Leptosphaeria cruenta** Sacc. Peritheciis in matrice sordide erubescente gregariis, erumpenti—superficialibus, globulosis, $\frac{1}{3}$ – $\frac{1}{2}$ mill. d., leviusculis, breve papillatis, nigris; ascis tereti-clavatis breve stipitatis, 90 ~ 10, octosporis; sporidiis fusoideis, utrinque acutiusculis, curvulis, 25–27 ~ 4 $\frac{1}{2}$ –5, 3-septatis, loculo secundo leniter protuberante, olivaceo-melleis. — In

- caulibus emortuis *Thalictri flavi*. L. (1281). — Matrice cruentata, peritheciis minoribus etc. a² proxima *L. Doliolo* recedit.
1243. **Leptosphaeria culmifraga** (Fr.) C. DNtrs. **propinquæ*: peritheciis subsuperficialibus, globoso-conoides, vage sparsis; ascis 120 ~ 17 teretiusculis; sporidiis fusoideis, curvulis, 35–45 ~ 7, 7–8-septatis, loculo quarto protuberante, olivaceo-melleis. — In foliis culmisque *Poæ aquaticeæ*, *Quœvilly*. Mb. (143) — **linearis*. F. G. 693; peritheciis subinnatis, seriatis; ascis teretiusculis 85 ~ 12; sporidiis similibus sed 26–30 ~ 5–5½, olivaceis. — In culmis *Brachypodii*, *Paris*, LÉVEILLÉ. M.
1244. **Leptosphaeria culmicola** (Fr.) Karst. **aquatica*: peritheciis sparsis, innatis; ascis teretiusculis 90–100 ~ 10; sporidiis tereti-fusoideis utrinque obtusiusculis, 25 ~ 4, 5–6-septatis, loculo tertio leniter protuberante flavidis. — In calamis *Scirpi lacustris*. T. (4884, 4890) — **rhizomatum*: ascis 80–85 ~ 10; sporidiis saepius 5-septatis, similibus, 25 ~ 5–5½, saturate flavidis. — In rhizomate *Phragmitis*. F. (18).
1245. **Leptosphaeria vagans** Karst. Fungi Spetsb. n. 37. — In calamis *Scirpi lacustris*. T. (4889). — Perithecia subcutanea, sparsa v. gregaria, globulosodepressa ½–⅓ mill. d.; asci tereti-clavati, brevissime stipitati 150 ~ 30, paraphysati, 8-spori; sporidia disticha oblongo-fusoidea, utrinque obtusiuscula, 40–45 ~ 10–12, curvula, 3-septata, denique ad septa leniter constricta, 4-nucleata, subhyalina. — *L. caricinella* Karst. et *junciseda* Karst. l. c. huic peraffines videntur.
1246. **Leptosphaeria molybdina** (Mont. & Moug.) Sacc. F. G. 580 (*Sphaeria*). — Peritheciis gregariis, subcutaneo-erumpentibus, globoso-lenticularibus, breve papillatis 150 micr. d.; ascis tereti-fusoideis, 70 ~ 15, brevissime stipitatis, paraphysatis, octosporis; sporidiis distichis tereti-fusoideis, utrinque obtusiusculis, curvulis, 22–26 ~ 6–6½, 3-septatis (raro 4–5-septatis) ad septa leniter constrictis, olivaceis. — In caulinis *Vincetoxicum officinalis*, GUEPIN. M.

1247. **Leptosphæria ogilviensis** (B. & Br.) C. DNtrs.
In caulibus Epilobii angustifolii in sylvis *Helvetiae*, Majo 1879, MORTIER. — Asci tereti-fusoidei, 120 ~ 15–16, paraphysati; sporidia teretiuscula, utrinque obtusiuscula, 35–40 ~ 5, 4–5-septata, ad septum medium leniter constricta, dilute flava.
1248. **Leptosphæria heterospora** (DNtrs.) Niessl. In rhizomatibus Iridis germanicæ nondum emortuis, *Elbeuf*. **Mb.** (116).
1249. **Leptosphæria Graminum** Sacc. Fung. ital. tab. 483. In foliis emortuis Avenæ fatuæ. **R.** (273). — *Lept. Avenæ* Auersw. Myc. Eur. satis differt. — *elæospora (*Perisporium Arundinis* **F. G.** 764 p. p.). A typo differt præcipue paraphysibus copiosissimis, sporiis denique olivaceis (15–18 ~ 4, triseptatis, loculo secundo sëpe leniter protuberante; ascis 60 ~ 14–15). In foliis Phragmitis communis, *Perpignan*, Oct. 1879, O. DEBEAUX.
1250. **Leptosphæria minima** (Duby) Sacc. **F. G.** 694 (*Sphæria*). — Peritheciis epiphyllis, punctiformibus, globoso-depressis, 100 micr. d., pertusis; ascis crasse fufoideis, apice rotundatis, 50–55 ~ 20, brevissime stipitatis, octosporis; sporidiis tristichis oblongis, utrinque rotundatis, 20–25 ~ 6–7, 2-septatis, non constrictis, ex olivaceo hyalinis. — In foliis subvivis fere immaculatis *Potentillæ argenteæ*, *Mende*, PROST. **M.**
1251. **Leptoshpæria helicicola** (Desm.) Niessl. In foliis *Hederæ Helicis*, *Chazy (Rhône)* **R.** (87).
1252. **Leptosphæria planiuscula** (Riess.) C. DNtrs.
In caulibus Solidaginis *Virgaureæ* in sylvis supra *Corcelles (Helvetia)*, Majo 1880, MORTIER. — Asci clavati, apice obtusi 120–130 ~ 20, stipitati; sporidia octona teretiuscula, 55 ~ 8–8 $\frac{1}{2}$, utrinque obtusiuscula, 5-septata, leniter constricta, varie guttulata, dilute flava.
1253. **Zignoella punctiformis** Sacc. & Th. Peritheciis dense gregariis, in cortice interiore relaxato subsuperficialibus, minutissimis, 100–120 micr. d., globulosis, papillatis, nigris, glabris sed basi hyphis brevibus con-

tinuis pallide fuligineis vestitis; ascis fusoideis breve stipitatis, apice obtusiusculis, 80 ~ 17, aparaphysatis(?) octosporis; sporidiis distichis oblongo-fusoideis, 18-20 ~ 8, utrinque obtusiusculis, initio 4-guttulatis, dein 3-septatis, leniterque ad septa constrictis, subhyalinis. — In cortice interiore Populi putrescentis, Lyon, Mayo 1880. T. (4982).

1254. **Sporormia intermedia** Auersw. F. G. 587. In simo vaccino in pascuis Vogesorum. M.
1255. **Perisporium vulgare** Corda (forma *macropoda*) In cortice interiore dejecto Populi, Lyon, Junio 1880 T. (4983).
1256. **Massaria Platani** Ces. In ramis corticatis Platanii. T. (4505).
1257. **Massaria inquinans** (Tode) Fr. In ramis corticatis Aceris campestris. T. (4758). — Sporidia 90 ~ 22.
1258. **Massaria Ulmi** Fuck. In ramis Ulmi. T. (4759)
— Sporidia 75 ~ 18.
1259. **Cucurbitaria elongata** Gray. **intermedia*. F. G. 564. In ramulis Cytisi sessilifolii, Alsatia. M.
— Inter *C. elongatam* et *C. Laburni* media.
1260. **Cucurbitaria Coronillæ** (Fr.) Sacc. F. G. 562. In ramulis Coronillæ Emeri, Montauban. R.
1261. **Pleospora herbarum** (Pers.) Rabh. *P. Pisi Fuck. F. G. 794. In caulibus Pisi sativi. R. — *P. Alii (Rabh.) C. DNtrs. F. G. 791. In scapis Allii Porri, Lambersart, DESMAZIERES.
1262. **Pleospora Asparagi** Rabh. In caulibus Asparagi officinalis. R. 105). — Ascii 120 ~ 25; sporidia soleæformia, 25-30 ~ 12-15, 5-6-septato-clathrata, olivacea, dein mellea.
- (568). **Pleospora pellita** Rabh. F. G. 784. In caulibus Papaveris Rhœadis in Vogenesis. M. — Ascii terebratusculi 130 ~ 12-14, paraphysati; sporidia oblique monosticha, fusoidea, 25 ~ 8-9, utrinque acutiuscula, 3-septata, ad septum medium constricta, ut plurimum loculis mediis vel saltem uno longit. diviso, mellea. — In Serie II. p. 63 sub *Leptosphaeria* habui, nixus Fu-

- ekelio qui (Symb. p. 135) septa longitudinalia nulla describit. *Sphaeria pellita* Curr. Linn. Trans. XXII. t. 59, fig. 129 et Cooke Haudb. 902 toto cœlo differt et veram Leptosphaeriae speciem sistit. *Pleospora calvescens* (Fr.) Tul. P. pellitæ perquam affinis est nec caret sporidiis quandoque longit. divisis. Cfr. Desm. Not. 1843 p. 353, Sacc. Fung. ital. tab. 550, etsi Fuckel contrarium doceat in Symb. p. 134.
1263. **Pleospora albicans** Fuck. Symb. — In caulis Crepidis, Brionne. **Mb.** (127). — Ascii teretiusculi 110 ~ 15; sporidia monosticha, 25 ~ 12, utrinque obtusiuscula, 5-septata, flava.
1264. **Pleospora scirpicola** (DC.) Karst. In calamis emortuis Scirpi lacustris. **T.** (4891). **R.** (9). **B.** (167). — Ascii crasse fusoidei, apice rotundati, breve stipitati, 250 ~ 45, octospori; sporidia disticha ova-to-oblonga, 50–60 ~ 20–28, utrinque obtusiuscula, plerumque 4-septata, raro 7-septata, ad septa (præcipue medium) constricta, septis longitudinalibus 1–2-seriatim divisa, dilute flava.
1265. **Pleospora Saccardiana** Roum. Rev. Myc. 1880 p. 188 et 221. — Peritheciis gregariis, epidermide velatis, globoso-depressis, papillatis, $\frac{1}{3}$ mill. d. contextu grosse parenchymatico fuligineo; ascis clavatis 90–100 ~ 18–20, nodoso-stipitatis, octosporis; sporidiis distichis ovoideis, 20–22 ~ 10–12, 3-septatis, constrictisque, septis longitudinalibus 1-seriatim, initio subhyalinis, dein olivaceo-melleis. — In ramulis Fraxini? circa Toulouse, hieme 1879. **R.** — A Pl. Bardanæ differt sporidiis utrinque obtusis, brevioribus, ascis clavatis crassioribus.
1266. **Pleospora oligomera** S. & S. ***P. daucina**. A typo differt sporidiis plerumque distichis nec monostichis, et e fronte paulo crassioribus, nempe 25–28 ~ 15–16 (e latere vero compressis 25 ~ 12), 3-septatis addito sepimento longitudinali (e latere non visibili) flavo-olivaceis; ascis cylindraceo-clavatis 110 ~ 20; peritheciis basi hyphis fuligineis conspicue cinctis, demum collapsis. — In caulis Dauci Carotæ prope Al-

- ger*, Majo 1880, TRABUT. — Ob sporidia compressa ad *Pleosporam platysporam* Sacc. Mich. II. 251 accedit.
1267. **Teichospora obducens** (Fr.) Fuck. **pinea*: sporidiis 5-septato-muriformibus, 20-25 \approx 10-12, fuligineis. — In ligno pineo *Le Sapey*. T. R. (171).
1268. **Capnodium australe** Ces. & Mont. In foliis *Taxi baccatae*. R. (50).
1269. **Capnodium elæophilum** (Mont.) F. G. 531. (*Antennaria*). In foliis ramisque *Oleæ europeæ* *Perpignan*, DEBEAUX.
1270. **Capnodium (Microxyphium) Taxi** Sacc. & Roum. ad int. Hypophyllum, glomerulosum, olivaceo-fuscum, hyphis cladosporioideis nodulosis, septatis, conidia fusoides 22 \approx 8, 1-3-septata gerentibus; peritheciis bacillaribus, 500-600 \approx 40, basi leniter incrassatis, fuligineis, apice obtusiusculis, pallidioribus, ascis et ascosporis..... In pagina inferiore foliorum *Taxi baccatae* in horto *Massey* prope *Tarbes*, hieme 1870. R. (398).
1271. **Capnodium salicinum** Mont. In foliis *Salicis vitellinæ*. R. (34).

Scolecosporæ

1272. **Cryptospora suffusa** (Fr.) Tul. F. G. 561 (*Valsa*). — In ramis *Alni glutinosæ*. M.
1273. **Lasiosphæria hirsuta** (Fr.) DNtrs. F. G. 793. In truncis putridis *Lozère*, PROST. M. R. (242).
1274. **Lasiosphæria Libertiana** Speg. & Roum. Rev. Mycol. 1880 p. 22. F. G. 672. — In culmis *Phalaridis arundinaceæ*. Lb. — Sec. Cooke, Grev. 1880 p. 86 ad *Las. ovinam* pertinet. Etsi vere affinis, tamen differre videtur sporidiis multo longioribus sursum saepe inflatulis septatisque.
1275. **Lasiosphæria macrotricha** (B. & Br.) Cooke in Grev. 1880 p. 86. *Sphæria*..... F. G. 684. In sarmenis putridis *Ruborum*. Lb.
1276. **Ophiobolus** *) **Therryanus** Sacc. & Roum. in

*) De hujus nominis præferendi ratione cfr. Mich. II. 253.

- Rev. 1880 p. 188 (sub *Rhaphidophora*). Peritheciis ligno colore immutato basi insculptis, gregariis, globosis $\frac{1}{4}$ mill. d., ostiolo breviter rostellato; ascis cylindraceis breviter stipitatis, 110–115 × 8–9, obsolete paraphysatis, octosporis; sporidiis bacillaribus, utrinque obtusiusculis, 100 × 2, guttulatis circa medium levissime nodulosis e hyalino luteolis. — In ligno pineo per aquam vecto, Lyon. T. R. (196).
1277. **Ophiobolus Urticæ** (Rabh.) Sacc. In caule Urticæ dioicæ. L. 1317.
- (597). **Ophiobolus rubellus** (Pers.) Sacc. In caule Pisi Mb. (177) et Scrophulariae L. (1372).
- (596). **Ophiobolus vulgaris** Sacc. In caule Eupatorii et Solani Mb. (134. 124), Saponariae T. (5352).
- (128). **Ophiobolus acuminatus** (Sow.) Duby. In caule Carduorum et Cirsiorum. R. (14), Mb. (158).

Quoad *Sphaeriam Panacis* F. G. 789, *Sph. Bro-meliæ* F. G. 570, *Sph. sepincolam* F. G. 585, *Sphaerellam Callunæ* F. G. 795, *Diatrypem Frangulæ* F. G. 555, ob imperfecta specimina nihil certi eruere potui.

Dothideaceæ

1278. **Dothidea insculpta** Wallr. F. G. 547. In sarmen-tis Vitalbæ putrescentibus. M.
1279. **Scirrhia rimosa** (A. S.) Fuck. In vaginis Phragmitis communis nondum prorsus matura. B. (158).
1280. **Scirrhia Poæ** (Fr.) Fuck. F. G. 667. In foliis Poæ sudeticæ. Lb. — Dubia quia sterilis vel immatura.
1281. **Phyllachora Pteridis** (Reb.) Fuck. F. G. 549. In frondibus Pteridis aquilinæ exsiccatis. M.
1282. **Phyllachora Cynodontis** (Sacc.) Niessl. In foliis Cynodontis Dactyli. R. (42. 43).

Hypocreaceæ

1283. **Cordyceps capitata** (Holmsk.) Link. F. G. 781.

- In Elaphomycete granulato parasitica in sylvis
Vogesorum. **M.**
1284. **Cordyceps ophioglossoides** (Schmid.) Link.
F. G. 780. In Elaphomycete granulato parasitica
cum præcedente. **M.**
1285. **Hypocrea rigens** (Fr.) Sacc. Mich. I. 301. In
ligno pineo udo prope Lyon. **T.** (5268).
1286. **Calonectria luteola** (Rob. & Desm.) Sacc. Mi-
chel. I. 315. In foliis Fraxini Orni circa Parisios,
LÉVEILLÉ. **M.**
1287. **Nectria Cucurbitula** (Tode) Fuck. In cortice
laricino. **R.** (108).
1288. **Nectria coccinea** (Pers.) Fr. v. **cespitalosa**.
In cortice Ailanthi. **R.** (134), **G.** (5).
1289. **Nectria Veuillotiana** Sacc. & Roum. Peritheciis
dense gregariis superficialibus, stromate subnullo fultis,
e globoso urceolatis, conspicue rugosis, $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ mill. d.,
apice late truncatis levibusque, ostiolo medio pertusis,
rubro-lateritiis; ascis cylindraceis subsessilibus, 110
× 10, apice initio sub-bi-foveolatis, aparaphysatis (?),
octosporis; sporidiis oblique monostichis, breve fusoi-
deis, rectis, 15-17 × 7- $\frac{1}{2}$, 1-septatis, non constrictis,
4-guttulatis, hyalinis. — In cortice putrescente Gle-
ditschiæ Triacanthi, Lyon, hieme 1879, THERRY.
R. (68. A.) — A *N. cinnabarina*, cui affinior, differt
peritheciis discretis, ascis sporidiisque majoribus, spo-
ridiis haud constrictis, utrinque acutiusculis.
1290. **Nectria lecanodes** Ces. **F. G.** 665. In thallo
languescente Peltigeræ caninæ. **Lb.**
1291. **Nectria erythrinella** (Nyl.) Tul. **F. G.** 664. In
thallo languido Peltigeræ polydactylæ. **Lb.** —
Specimina parum evoluta, ergo non certa.
1292. **Nectria chlorella** (Fr.) Tul. Michel. I. 289. *Ce-
nangium chlorellum* Fr. **F. G.** 777. — In cortice
Abietis. **M.** — Asci teretiusculi 60-70 × 7-8, apice
obtusiusculi sed non more nectriaceo constricti, parce
paraphysati, octospori; sporidia subdisticha breve ova-
to-oblonga, 8-9 × 5, 1-septata, non constricta, hyali-
na. Peritheci contextus parenchymaticus, olivascens.

1293. **Oomyces carneo-albus** (Lib.) B. & Br. In culmis putridis Brachypodii. **B.** (D.) — Asci cylindrici breve stipitati, 140 ± 7, octospori (ut videtur); sporidia filiformia, 80–90 ± $\frac{3}{4}$ –1, minute guttulata, rectiuscula, hyalina.
1294. **Gibberella pulicaris** (Fr.) Sacc. In cortice Samuci. **R.** (197). — In cortice Platani. **R.** (244).

Hysteriaceæ

1295. **Aylographum Pinorum** Desm. In acubus Pini sylvestris, Saintes. **B.** (1). — Perithecia exigua furcata vel substellata; asci tereti-clavati (immaturi) paraphysibus filiformibus sæpe furcatis obvallati.
1296. **Lophodermium xylomoides** Chev. **F. G.** 551. (*Hysterium*). — In foliis Crataegi, hieme. **M.**
1297. **Lophodermium maculare** (Fr.) DNtrs. **F. G.** 553. In foliis aridis Vaccinii uliginosi. **M.**
1298. **Lophodermium ciliatum** (Lib.) Speg. & Roum. **F. G.** 662. Ad caules Epilobii angustifolii. **Lb.** — Asci clavati 70–80 ± 7–8; sporidia filiformia, guttulata ascos subæquantia.
1299. **Hypoderma aquilinum** (Schum.) Rehm. Ascom. n.º 270. *Hysterium aquilinum* Schum., M. U. n.º 73. *Sphaeria aquilina* Fr. **F. G.** 692. — In frondibus Pteridis aquilinæ, in sylvis Juranis, CHAILLET. **M.** — Est forma frondicola deminuta, quæ, ubi in stipites descendit, major evadit. Asci tereti-clavati, 60 ± 8, paraphysibus bacillaribus obvallati; sporidia filiformia (im-matura visa).
1300. **Hypoderma commune** (Fr.) Duby *nitidum. **F. G.** 552. In caulis Solidaginis Virgaureæ. **M.**
1301. **Hypoderma Hederæ** (Mart.) DNtrs. **F. G.** 554. In foliis aridis Hederæ. **M.**
1302. **Hysterium** (Gloniopsis) **microthecium** S. & S. Mich. I. 414. In culmorum areolis dealbatis Arundinis Donacis. **R.** (302 A). — Asci breves, clavati 40 ± 18 subsessiles; sporidia disticha oblonga v. subclavulata 15–16 ± 5, 4-nucleata, tandem 3-septata, non constricta, hyalina.

1303. **Triblidium hysterinum** Duf. In trunco *Buxi* semper virentis. **R.** (217). — Asci cylindracei 100–120 × 15, copiose paraphysati, octospori; sporidia ovato-oblonga, constricto-1-septata, 20 × 12, atrofumiginea. — Genus pari fere jure inter Discomyctes collocandum. *Triblidium rhopalascum* Sacc. (Cfr. Michel. I. 54 et Speg. Ampelom. tab. 35!) vere diversum est.

Onygenaeæ

1304. **Onygena piligera** Fr. **F. G.** 762. In panno putri, *Roussillon*, 30 Julio 1879, X. GILLOT.

Discomyceteæ

1305. **Leotia lubrica** Pers. **F. G.** 712. In sylvis Vogeniacis. **M.**
1306. **Ombrophila Clavus** (A. S.) Cooke Grev. 1880 p. 84. *Leotia aquatica* Lib. **F. G.** 639. — In lignis inundatis. **Lb.**
1307. **Calloria chrysocoma** (Bull.) Fr. In disco ligni fraxinei udi. **R.** (190).
1308. **Bulgaria inquinans** (Pers.) Fr. **F. G.** 769. In cortice quercino, *Toulouse*, aut. 1879. **R.** — *Lyon.* **T.** (5194).
1309. **Mitrula cucullata** Fr. **F. G.** 713. In sylvis aceris Vogenorum. **M.**
1310. **Vibrissa truncorum** (A. S.) Fr. **F. G.** 536. Ad ligna pinæa in Vogenorum rivulis. **M.**
1311. **Peziza (Acetabula) melæna** Fr. **F. G.** 771. In fragmentis ligneis in sylvis abiegnis Vogenorum. **M.**
1312. **Peziza (Otidea) onotica** Pers. In sylvaticis, *Francheville (Rhône)* Oct. 1880. **T.** (5244).
1313. **Peziza (Humaria) Jungermanniæ** Nees & Fr., Cooke Mycogr. t. 87. *P. viridis* West., **F. G.** 775, nec Bolt. — Inter muscos et hepaticas, *Bruyères*. **M.** — Asci tereti-clavati 110–120 × 16–18, breve stipitati, paraphysibus sursum clavatis viridulisque obvallati, octospori; sporidia ovato-oblonga, 20–22 × 10,

- sæpe inæquilateralia, granulosa, hyalina, interdum vi-
rescentia.
1314. **Peziza** (Humaria) **rutilans** Fr. **F. G.** 774. Inter
muscos in silvis Vogesorum. **M.**
1315. **Peziza** (Humaria) **carnea** (Pers.) Karst., *Pyro-*
nema Franzonianum var. **F. G.** 641. — In charta
zeina putri. **Lb.**
1316. **Peziza** (Pyronema) **omphalodes** Bull. In detritis
e sacchari purificatione, *Alençon*, Jan. 1881. **G.**
Hyphæ ad basim cupulæ variæ, acuminatæ v. obtu-
siusculæ, continuæ v. septulatæ, hyalinæ, interdum 150
~ 12–15; asci tubulosi, 150 ~ 10–12, paraphysibus
bacillaribus copiosis (saltem initio) obvallati; sporidia
monosticha, ellipsoidea 10–14 ~ 7–8, granulosa, hyali-
na. Est forma cupulis solito majoribus ($\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ mill. d.)
et satis discretis, miniatis; subiculo parum distincto,
ita ut ad *Neottiellæ* sectionem nutet.
1317. **Peziza** (Humaria) **Patouillardii** Gill. & Sacc.
Ascomatibus fructicolis, scutellatis, breve crasseque
stipitalis, $1\frac{1}{4}$ mill. diam., $1\frac{1}{2}$ mill. altis, carnosulis
ubique fulvo-ochraceis, levibus glabris, disco concavo;
contextu ascomatis laxe parenchymatico flavo-oliva-
scente, cellulis 30–40 micr. diam.; ascis tereti-fusoi-
deis, apice truncatis spurieque operculatis, deorsum at-
tenuatis, subsessilibus, jodii ope immutatis, 110–120
~ 15–20, paraphysibus filiformibus obvallatis, octospo-
ris; sporidiis fusoideis, utrinque acutiusculis, 16–18 ~ 8,
nucleatis, hyalinis. — In acheniis fermentescientibus
Fagopyri esculenti, *Alençon*, legit cl. **PATOUIL-
LARD**, cui merito dicata species, communicavit cl. **GIL-
LET**. — Pertinet ad Sect. C.** cl. **Cookei**, sed nulli
speciei mihi notæ affinis videtur.
1318. **Sclerotinia** **Pruni spinosæ** (Lib.) Speg. &
Roum. **F. G.** 642. — In foliis *Pruni spinosæ*
putridis. **Lb.**
1319. **Ciboria echinophila** (Bull.) Sacc. In spinis cap-
sularum *Castaneæ*, *S. Leonard*, E. **LAMY**. **M.**
1320. **Helotium Amenti** (Batsch,) Karst **F. G.** 649.
In capsulis *Salicis* putrescentibus. **Lb.**

1321. **Helotium albellum** (With.) Karst. In palis putrescentibus, *Francheville (Rhône)* **T.** (5168). — Asci tereti—clavati 40×6 ; sporidia oblongo—teretiuscula 7×2 , hyalina.
1322. **Helotium Cacaliæ** (Fr.) Sacc. ***pallidius**: ascomatibus typo minoribus atque pallidioribus; ascis $50-60 \times 5$; sporidiis tereti—fusoideis, $7-9 \times 1-1\frac{1}{4}$, hyalinis. — In caule putri *Amaranthi*. **T.** (4869).
1323. **Godronia Muhlenbeckii** Moug. (1845) *G. angulata* Lév. (1846) **F. G.** 776. Cfr. Rev. Mycol. 1880 p. 39 pl. V. fig. A. — In culmis *Phragmitis communis* *au fonds de Toul (Meurthe)* Doct. GODRON. **M.** — Ascis maturos in exemplaribus examinatis detegere non potui sed ex iconе Lév. in Rev. Myc. l. c. sunt clavati, paraphysati, sporidiis octonis bacillaribus asco brevioribus prædicti.
1324. **Godronia belonospora** (Nyl.) Sacc. *Crumenula belonospora* (Nyl.) Karst. **F. G.** 657. — In lignis putrescentibus. **Lb.** — Ascii prælongi, $180-200 \times 8-9$; sporidia filiformia 150×2 hyalina; paraphyses clavulatae; excipuli contextus parenchymaticus, fuligineus, cellulæ prope ascomatis marginem relaxatae. — *Crumenulae* genus Notarianum (1861) cum gen. *Godronia* Moug. (1845) multo anteriore omnibus notis congruit.
- (688). **Niptera melatephra** (Lasch.) Sacc. In culmis Poæ aquatice putrescentibus. **Mb.** (142). — Ascii $45-50 \times 6\frac{1}{2}-7$; sporidia fusoidea leniter curva, $12-13 \times 2$, hyalina. Ascomata cervina, disco pellentia.
1325. **Pyrenopeziza Karstenii** Sacc. *Mollisia Graminis* Karst. Fenn. l. 195, nec Desm. In culmis emortuis Agrostidis. **Mb.** (131). — Ascii tereti—fusoidei, 40×6 ; sporidia tereti—fusoidea, curvula, $8-10 \times 1\frac{1}{2}-1\frac{3}{4}$, guttulata, simulateque 1—septata, hyalina. Cellulæ excipuli polyædricæ, marginales oblongæ.
1326. **Pyrenopeziza Graminis** (Desm.) Sacc. ***P. glabratæ** (Rev. Myc. 1881 p. 49 not. 1). In culmis putrescentibus Moliniæ coeruleæ. **Mb.** (179). — ***P. crastophila**: ascomatibus brunneis disco albicante, concaviusculo; ascis clavatis, utrinque acutatis,

- 72 - 8-9, paraphysibus simplicibus furcatisve obvallatis, octosporis; sporidiis distichis ellipsoideo—oblongis, 15-18 = 4-5, 2-guttatis, hyalinis. — In culmis Moliniæ cœruleæ. **Mb.** (180).
1327. **Pyrenopeziza Rubi** (Fr.) Rehm, Mich. II. 82. *Cenangium rugosum* Niessl., **F. G.** 655. — In samentis Rubi fruticosi. **Lb.**
1328. **Pyrenopeziza millepunctata** Sacc. **F. G.** 644. Ad caules Senecionis sarracenici. **Lb.**
1329. **Dasyscypha bruyerensis** (Roum.) Sacc. **F. G.** 646 (*Peziza*)—*Helotium calycinum* Karst. Fenn. I. 114, nec *Dasyscypha calycina* Fuck. et plur. auct. — In cortice Pini, *Bruyeres* (*Vosges*). **M.** — Ascomata adulta satis aperta, glabriuscula, tota alutacea (in siccо), 2 mill. d.; asci tereti-clavulati, longe sensim stipitati, 65 = 4-5, p. s. 40-45 long. paraphysati, octospori; sporidia oblique monosticha tereti-clavulata, 7 \times $1\frac{1}{2}$ -2, hyalina. — *Das. calycina* Fuck. sporidia multo ampliora gerit, *Das. chrysopthalma* sporidia globulosa; *Das. bicolor* nostræ propius accedit sed differt colore et indumento diversis.
1330. **Trichopeziza Secalis** (Lib.) Sacc. **F. G.** 651 (*Helotium flammeum*). Ad culmos dejectos Secalis Cerealis. **Lb.** — Ascus maturos non vidi.
1331. **Trichopeziza mollissima** (Lasch.) Fuck. **F. G.** 643 (*Lachnum*). — Ad culmos putridos Valerianæ et Actææ. **Lb.**
1332. **Trichopeziza patens** (Fr.) Sacc. *Peziza palearum* Desm. **F. G.** 540. — In culmis putrescentibus, *Luchon*, Julio 1879. **R.** — In culmis putridis Brachypodii sylvatici. **L.** (849. 855). — Ascomatis pili clavulati, asperuli, fulvo-fuliginei. Asci minutti clavato-teretes 35-40 = 5, paraphysibus longioribus cuspidatis flavicantibus obvallati; sporidia disticha anguste fusoidea 10 = 1- $1\frac{1}{2}$ hyalina, curvula.
1333. **Trichopeziza relicina** (Fr.) Fuck., Mich. II. 164. — In caulibus herbarum majorum (*Urticæ*, *Petasitis*) *Grande Chartreuse*, Junio 1879. **T.** (3616, cum icone optima).

1334. **Tapesia Rosæ** (Pers.) Fuck. **F. G.** 647. In truncis Rosæ alpinæ in Vogesis. **M.**
1335. **Stamnaria Persoonii** Fuck. In caulis siccis Equiseti arvensis, Majo 1880, près Corcelles, Doct. MORTHIER.
1336. **Pseudopeziza Peltigeræ** Fuck. **F. G.** 658. *Leciographa? circinans* (Lib.) Phillips, Grevillea 1880 p. 84. — In thallo Peltigeræ caninæ. **Lb.**
1337. **Trochila pusilla** (Lib.) Speg. et Roum. **F. G.** 663. Ad calamos Junci conglomerati, socia *Phoma caricina* Lib. **Lb.** — Asci tereti-clavati, 35–40 × 10, octospori; sporidia oblonga, subcurvula, 10 × 2½–3, utrinque obtusiuscula, hyalina. — Ad *Pyrenopezizam* æquo fere jure duci potest.
1338. **Phacidium abietinum** Kunze & Schm. **F. G.** 659. In foliis Abietis excelsæ. **Lb.**
1339. **Phacidium Medicaginis** Lib. In foliis Medicaginis sativæ. **R.** (208).
1340. **Phacidium Rubi** Fr. In foliis Rubi Idæi languidis ad pag. superiore. **R.** (73. 74). — Specimina immatura.
1341. **Phacidium Trifolii** (Bernh.) Boud. **F. G.** 660. Ad folia viva vel languida Trifolii medii. **Lb.**
- FAVRÆA** Sacc. nov. gen. Ascomata innato-erumpentia (hucusque phyllogena) sessilia, depressa, disco mox aperto applanato, tenui-marginata, molliuscula. Asci elongati, octospori; sporidia ovato-oblonga, 1-septata, hyalina. — Novum genus *Favræa*, Doct. J. H. FAVRE eximiæ monographiæ Sphaeriacearum Vallis-clausensium auctori jure meritoque dicatum, colligit *Phacidii* species sporidiis uniseptatis hyalinis ornatas.
- (161). **Favræa congener** (Ces.) Sacc. Michel. I. 515. — *Stigmata Ranunculi*. **F. G.** 626, nec Fries. — *Phac. Ranunculorum* Desm. **F. G.** 778. — In pag. infer. foliorum Ranunculi repentis, bulbosi et acris, *Lebisey, Lozère, DESMAZIERES, PROST.* — *Phacidium Ranunculi* Lib. (seu *Stigmata Ranunculi* Fr. seu *Phacidium Friesii* Ces. seu *Phlyctidium Ranunculi* Wallr. seu *Pseudopeziza Ranunculi* Fuck.) speciem vere diversam sistit.

- (703). **Heterosphæria Patella** (Tode) Grev. *Peziza Chailletii* Pers. **F. G.** 772, nec Fuck. nec Sacc. Michel. I. 64. *Phacidium Patella* Fr. f. *alpestris* Fr. Elench. II, 133. — In caulis Gentianæ luteæ in Vogesia. **M.** (forma ascigera!).
1342. **Coccomyces quadratus** (Schmid.) Karst. Myc. Fenn. I. 255. *Phacidium leptideum* Fr. **F. G.** 543. In caulis exsiccatis Vaccinii Myrtilli. **M.**
1343. **Abrothallus parasiticus** (DNtrs.) Nyl. **F. G.** 535. In thallo Parmeliæ caperatae, *Toulouse*, Sept. 1878. **R.**
1344. **Cenangium Sarothamni** Fuck. **F. G.** 656. Ad ramulos Sarothamni scoparii. **Lb.**
1345. **Cenangium vernicosum** Fuck. **F. G.** 652. In ramulis Pruni Padi (*Pycnidium sistens Phomam polymorpham* [Auersw.] Speg. & Roum.). **Lb.**
1346. **Dothiora Sorbi** (Wahl.) Fr., Fuck. Symb. 275. *Dothichiza Sorbi* Lib. **F. G.** 627 (nec *Micropera Sorbi* Thüm. Hedw. 1880 p. 189, quæ *Phomam* sicut). — In ramulis Sorbi Aucupariae. **Lb.** — Ad sunt asci immaturi, 80 × 14; spermatia vero non vidi.
1347. **Pezicula Rosæ** Sacc. (sub *Cenango*). In ramis emortuis Rosæ caninæ. **Mb.** (154).
1348. **Pezicula carpinea** (Pers.) Tul. **F. G.** 538. In cortice Carpinii, autumno. **M.** — Ob ascomata initio erumpentia, epidermideque fissâ cincta ad *Ocellariam* vergit.
1349. **Pezicula cinnamomea** (DC.) Sacc. f. *Castaneæ*. — In cortice Castaneæ vescæ, socia *Endothia gryposa*. **R.** (375). — Ascomata erumpenti-superficialia, flavo-cinnamomea, subfragilia, sessilia, complanata; asci crasse clavati 80 × 18, subsessiles, apice rotundati, octospori; sporidia disticha ellipsoideo-oblonga inæquilateralia 20–25 × 8–9, crasse 3–4-guttata, hyalina.
1350. **Blitridium calyciiforme** (Reb.) DNtrs. **F. G.** 661 (*Triblidium*). — In cortice abietino, *Lozère*, PROST. **M.**
1351. **Durella compressa** (Pers.) Fuck. **F. G.** 539. In assulis Coryli Avellanæ, Aprili. **M.**

1352. **Patellaria patinelloides** Sacc. & Roum. Rev. Mycol. 1880 p. 189. — Ascomatibus superficialibus, gregariis, plano-patellatis, breve marginatis $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ mill. d., opace nigris; ascis clavatis, breve stipitatis, apice rotundatis, 45-10-15, paraphysibus filiformibus, apice capitulo fusco subrotundo varie septato terminatis obvallatis, octosporis; sporidiis distichis oblongo-ellipsoideis 10-12 = 5-5 $\frac{1}{2}$, uniseptatis, non constrictis, 2-guttulatis, fuligineis. — In cortice Robiniae Pseudacaciae prope Lyon, THERRY, hieme 1879. — A *Patell. Strikeri* (Körb.) differt paraphysibus apice septato-capitatis, sporidiis crassioribus et brevioribus, ascomatibus prorsus nigris &c.
1353. **Patellaria buelliooides** Sacc. Ascomatibus gregariis superficialibus, scutellatis, sessilibus, centro affixis, 1 mill. diam., concaviusculis, distincte acutiuscule marginatis, atro-nitentibus, subcoriaceis; ascis tereti-clavatis apice rotundatis, breve stipitatis, 100 = 18, paraphysibus filiformibus obvallatis, octosporis; sporidiis distichis oblongo-ellipsoideis 15-17 = 8, utrinque rotundatis, 1-septatis, lenissime constrictis, atrofuligineis, quandoque 2-guttulatis. — In ramis corticatis putrescentibus fagineis(!) G. (21). — Sporidiis crassioribus a *Pat. nigerrima* Sacc. facile distinguenda species. Comparavi quoque cum *Buellia parasema* DNtrs, a qua, praeter thalli defectum, ascomatibus concavis, acute marginatis, atro-nitidis etc. dignoscitur.
1354. **Propolis** (Ocellaria) **ocellata** (Pers.) Sacc. In cortice Populi tremulae emortuo. R. (189). — Ascis tereti-clavati, crassi, 150-160 = 25, bacillari-paraphysati, breve stipitati, octospori; sporidia oblique monosticha ellipsoideo-oblonga, utrinque acutiuscula, 30-34 = 15, intus granulosa, hyalina.
1355. **Propolis** (Ocellaria) **succinea** Sacc. Ascomatibus innato-erumpentibus, disciformibus, epidermide lacerata cinctis, gregariis, $\frac{1}{2}$ mill. diam., succineis, levibus excipuli contextu parenchymatico flavicante; ascis clavatis, breve stipitatis, 90-100 = 16, paraphysibus bacilaribus obvallatis, apice rotundatis, octosporis; sporidiis

- distichis ovato-oblongis, saepc inaequilateralibus, 18–20
 ~ 7, intus granulosis, hyalinis. — In ramis Genistæ
 tinctoriae emortuis, Lyon, Sept. 1880. **T.** (5118).
 — Hic *Calloriae*, hinc *Phacidio* affinis.
1356. **Stictis graminum** Desm. — In vaginis foliorum
Bromi languidorum. **L.** (1326^{bis}). — Ascii teretes,
 subsessiles, 60 ~ 8; sporidia octona, bacillaria, 50 ~ 1,
 continua, hyalina.
1357. **Rhytisma punctatum** (Pers.) Fr. **F. G.** 595.
 In foliis *Aceris Pseudoplatani*, Autun, autumno
 1870. **R.** — Quoad *Rhytisma Bauhiniae*, **F. G.**
 779, ob specimina manca, nil certi eruere potui.
1358. **Hymenobolus Agaves** Dur. & Mont. Syll. 191.
 — In foliis putridis *Agaves americanæ*, *Alger*,
 TRABUT. — Ascii cylindrici, p. s. 100–120 ~ 8–9 apice,
 tunica integra, obtusiusculi, breve sensim stipitati,
 paraphysibus bacillaribus hyalinis obvallati octospori;
 sporidia oblique monosticha, oblongo-ellipsoidea, 15–17
 ~ 8, fuliginea, guttulâ crassâ pallidiore foeta.
1359. **Ascomyces aureus** (Pers.) Magn. *Taphrina populea* Fr. **F. G.** 600. — In foliis *Populi nigræ*. **R.**

Myxomyceteæ

1360. **Lamproderma physaroides** (A. S.) Rost. In
 muscis majoribus subvivis. **R.** (264). — Sporæ glo-
 bosæ 12–13 micr. d., leves, atroviolaceæ.
1361. **Lamproderma arcyrioides** (Somm.) Rost. In
 frustulis ligneis putrescentibus. **R.** (137. 138). —
 Sporæ globosæ, 12–14, echinulatæ, atro-violaceæ. —
 Ad hanc forte speciem spectant exemplaria immatura
T. (5202) in *graminum* foliis.
1362. **Physarum psittacinum** Ditm. Ad folia putrescen-
 tia *Pini sylvestris*. **Mb.** (176). — Flocci hyalini
 copiosi, $1\frac{1}{2}$ –2 micr. diam., gangliis calcareis angulosis
 copiosissimis intermixti; sporæ globosæ, 7–8 micr. d.,
 intus granulosæ, leves, fuligineo-violaceæ. Stipes amœ-
 ne aurantiaco-rubellus, striatus.
1363. **Physarum cinereum** (Batsch) Pers. *ovoideum:

- peridiis verticaliter ovoideis, dense gregariis; floccis albidis, in ganglia calcarea varia abeuntibus; sporis globulosis 12 micr. d., levibus, atro-fuligineis. — In cortice Ailanthi glandulosæ. **R.** (177).
1364. **Badhamia inaurata** Curr. In museis majoribus submortuis. **R.** (265). — Flocci ramosi filiformes, atri in ganglia varia flava confluentes; sporæ globulosæ 8–11 micr. d. violaceæ. A forma, quam in Michel. I. 545 enumeravi, differt sporis minoribus, levioribus, an ab ætate minus proiecta?
1365. **Chondrioderma difforme** (Bull.) Rost. In cortice duriore populino, *Lyon*. **T.** (5119). — Sporæ globulosæ 12 micr. leves, violaceo-fuscæ, siccae complicatae, naviculares; flocci pauci filiformes, hyalini.
1366. **Didymium Serpula** Fr. In frustulis variis in horris *Lyon*, Julio 1880. **T.** (5027).
1367. **Angioridium sinuosum** (Bull.) Grev. In foliis putrescentibus quercinis. **T.** (5080). — Ganglia calcarea copiosa, majuscula, lutescentia. Sporæ globosæ, leves, 8 micr. d. violaceo-fuscæ.
1368. **Trichia varia** Pers. In ligno putri molli. **R.** (76). — Flocci flexuosi abrupte acuminati, subleves; sporæ globosæ 12–13 diam. flavæ.
1369. **Trichia scabra** Rost. In ligno putri molli. **R.** (76^{bis}). — Flocci ubique echinulati, abrupte acuminati; sporæ globosæ 10 micr. diam. flavæ.

Sphæropsideæ

Ser. 1. SPHÆRIOIDEÆ

Sect. 1. HYALOSPORÆ

1370. **Phoma Janiphæ** Thüm. **F. G.** 718 (*Sphæropsis*). — In caulis Jatrophæ Janiphæ cultæ, *Collioure*. **R.** — Spermatia ovoidea 4–5 × 3, hyalina, 2-guttulata.
1371. **Phoma acicola** (Lév.) Sacc. **F. G.** 677. In acubus Pini sylvestris, *Paris*, LÉVEILLÉ. **M.**
1372. **Phoma acanthina** Sacc. & Roum. Peritheciis den-

- se gregariis, subcutaneis, globoso-depressis, pertusis, 150 micr. diam.; spermatiis oblongis leniter curvis utrinque obtusiusculis, 16-18 \times 6-7, nubilosis, hyalinis, basidiis filiformibus sesquilonioribus suffultis. — In caulibus Acanthi mollis culti, *Montauban*, hieme 1809. R.
1373. **Phoma** (Dendrophoma) **Therryana** Sacc. & Roum.
 Peritheciis erumpenti—superficialibus, gregariis v. hinc inde subaggregatis, globoso—inæqualibus, atris, $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ mill. d., vix papillatis; sprematiis ovoideis, 3 \times 1, basidiis verticillato—ramos, acicularibus, 25 \times 1, suffultis. — In cortice *Platani*(?) in horto botanico *Lyon*, hieme 1879. T. — Formam subsimilem in trunco *Castaneæ*, *Conegliano*, ipse observavi: sprematiis 3 \times 1, basidiis 15-20 \times 1, peritheciis subsuperficialibus.
1374. **Phoma** (Diaporthe) **berberina** Sacc. & Roum.
 Peritheciis sparsis v. laxe gregariis, sub—cutaneis, globoso—depressis, nigro—griseis; sprematiis fusoideis 6-7 \approx 2- $\frac{1}{2}$, biguttulatis, hyalinis. — In ramulis *Berberidis vulgaris*, *Tarbes*, aut. 1879. R.
1375. **Phoma Ericæ** (Fr.?) Sacc. *Sphaeria Ericæ* Fr. El. II. 101(?). — In trunco *Ericæ vulgaris* emortuo *Brionne*. Mb. (169). — Perithecia majuscula, denique superficia, globoso—depressa, papillulata, nigra, tandem dilabentia et in matrice maculam subcircularem $\frac{1}{2}$ mill. d., nigricantem relictuantia; sprematia oblongo—ovoidea, utrinque obtusiuscula, 14-15 \times 6-7 nubilosa, hyalina, basidiis bacillaribus, 12-15 \times $1\frac{1}{2}$, hyalinis suffulta.
1376. **Phoma Anethi** (Pers.) Sacc. *Diplodia Anethi*. F. G. 614. — In caulibus *Anethi graveolentis*, *Strasbourg*, NESTLER. — Ipse sprematia non vidi sed ex Fuck. sunt ovato—oblonga, 4 micr. longa, hyalina.
1377. **Phoma** (Dendrophoma) **Rhododendri** (Roum.) Sacc. *Cytispora Rhododendri* Roum. F. G. 517 p. p. (*Diplodia illicicola*). Peritheciis gregariis, subcutaneis, intus albis, minutis, vix erumpentibus; sprematiis per exiguis teretiusculis, 4 \times $\frac{1}{2}$, hyalinis, copiosissimis basidiis bacillaribus, saepe verticillato—ramulos, 10-15

- $\approx \frac{3}{4}$ suffultis. — In ramis *Rhododendri pontici* *Tarbes*, socia *Diplodia*, Martio 1879. **R.**
- (230). **Phoma lirelliformis** Sacc. *Leptostroma hysterioides*. **F. G.** 511. — In caulis *Paeoniae*, *Toulouse*. **R.** — Spermatia breve fusoidea, 8-10 \times 2- $2\frac{1}{2}$, hyalina, basidiis longis bacillaribus suffulta.
1378. **Phoma sylvatica** Sacc. Peritheciis gregariis, subcutaneis, prominulis, globulosis, 150 micr. d., ostiolo minuto; spermatiis, oblongo-cylindraceis, minutis, 4 \approx 1, utrinque rotundatis, 2-guttulatis, hyalinis. — In caulis emortuis *Melampyri sylvatici*. **Mb.** (165).
1379. **Phoma herbarum** West. *Dipsaci*: sperm. 8-9 \approx 3-4, 2-guttulata, hyalina. **Mb.** (109). — *Mercurialis*: sperm. 6-7 \approx 2 $\frac{1}{2}$, lenissime curva, 2-guttulata. **Mb.** (132). **L.** (1335). — *Sambuci nigrae*: sperm. 6-8 \approx 3- $3\frac{1}{2}$, curvula. **R.** (359). — *Solidaginis*: sperm. 7-9 \approx 3-4, recta. **Mb.** (95). — *Aristolochiae Siphonis*: sperm. 7 \approx 4- $4\frac{1}{2}$. **Mb.** (89). — *Valerianae*: sperm. 6 \approx 3 $\frac{1}{2}$. **Mb.** (92). — *Antirrhini*: sperm. 8-9 \approx 3 $\frac{1}{2}$. **G.** (7).
1380. **Phoma oleracea** Sacc. — *Antirrhini*: sperm. 4-5 \approx 1 $\frac{1}{2}$ -2, **Mb.** (107). — *Urticæ*: sperm. 5-6 \approx 2. **R.** (321). — *Dipsaci*: sperm. 5 \approx 1 $\frac{1}{2}$. **Mb.** (109). — *Scrophulariæ*: sperm. 5 \approx 2. **R.** (276). — *Solidaginis*: sperm. 5-6 \approx 1 $\frac{1}{4}$, curvula. **Mb.** (116^{bis}). — *Helianthi tuberosi*: sperm. 5 \approx 2, recta. **L.** (1311).
1381. **Phoma errabunda** Desm. In caulis emortuis *Verbasci Thapsi*. **R.** (96). — Perithecia globo-depressa, 200 micr. d., pertusa, contextu parenchymatico distincto, fuligineo, spermatia perexigua, ovoidea, 3-4 \approx 1 $\frac{1}{2}$, hyalina.
- (773). **Phoma acuta** Fuck. In caulis *Petasites et Gentianæ*. **R.** (139. 141). — Spermatia oblonga 5 \approx 1-1 $\frac{1}{2}$, 2-guttulata, hyalina.
1382. **Phoma complanata** (Tode) Desm. In caulis emortuis *Heraclei Sphondylii*. **T.** (4941. 4942) et *Angelicæ*. **Mb.** (108). — Perithecia erumpen-

- ti—superficialia, majuscula, $\frac{1}{2}$ mill. d., mox compresso-umbilicata, ostiolo papillato; contextu parenchymatico, atrofuligineo, solidiusculo; spermatia oblonga, curvula, $5-6 \div 2-2\frac{1}{4}$, biguttulata, hyalina.
1383. **Phoma Crepini** Speg. & Roum. **F. G.** 654 (*Cenangii populini* Spermogonium). — In ramis Populi fastigiatæ. **Lb.** — Perithecia erumpentia, cæspitulosa, globoso—papillulata, contextu parenchymatico, rufescente; spermatia oblonga, minutissima, $4 \div 1$, 2-guttulata, hyalina, sæpe curvula.
1384. **Phoma Libertiana** Speg. & Roum. **F. G.** 653 (*Cenangii Pinastri* (Tul.) Fuck. Spermogonium). — In ramulis Abietis. **Lb.** — Perithecia gregaria, erumpentia, globoso—depressa, papillulata, contextu parenchymatico rufescente; spermatia ovoidea, utrinque obtusiuscula, $6-6\frac{1}{2} \div 3$, 2-guttulata, hyalina.
1385. **Phoma (Dendrophoma) lophiostomoides** Sacc. Peritheciis seriatim et parallele gregariis, compressis, minutis, nigris, ostiolo subrimoso; spermatiis teretusculis utrinque rotundatis, $8 \div 1$, 2-guttulatis, hyalinis, bacillaribus, 18—24 $\div 2$, parce et breve ramulosis suffultis. — In culmis Tritici vel Secalis. **L.** (1283).
1386. **Phoma suberina** Sacc. Peritheciis gregariis sub-superficialibus, hemisphæricis, $\frac{1}{6}$ mill. d., subinæquilibus, vix papillatis, nigris; spermatiis oblongo-ellipsoideis, $5-6 \div 2$, 2-guttulatis, hyalinis. — In subere udo putrescente (*bouchon de bouteille*) Lyon, aut. 1880. **T.** (4398).
1387. **Phoma sphærospora** Sacc. Peritheciis gregariis erumpenti—superficialibus, globulosis, obtuse papillatis, densiusculis, nigris, $\frac{1}{3}$ mill. d.; spermatiis globulosis deorsum brevissime apiculatis, $9-14 \div 8-10$, nucleo nucleolato fœtis, hyalinis. — In ramulis Ailanthis(?) Lyon. **T.** (4914). — *Phomæ Hippoglossi* affinis.
1388. **Phoma (Diaporthe) Coluteæ** Sacc. & Roum. Peritheciis gregariis lenticularibus, $\frac{1}{3}$ mill. d., initio epidermide cinerascente velatis, griseis; spermatiis oblongis, $7 \div 3$, 2-guttulatis, hyalinis, basidiis subæquilon-

- gis suffultis. — In ramis Coluteæ arborescentis, près Toulouse, hieme 1879. R.
1389. **Phoma** (Diaporthe) **carpogena** Sacc. & Roum. Peritheciis sparsis majusculis, $\frac{1}{2}$ mill. d., globoso-depressis, atronitidulis, initio velatis; spermatiis fusoideis, 6-8 \approx $2\frac{1}{2}$, biguttulatis, hyalinis. — In interiore capsularum Catalpæ syringifoliæ, près Toulouse, aut. 1879. R. — Forte Diaporthis spissæ Sacc. & Speg. spermogonium.
1390. **Phoma** (Diaporthe) **Paulowniæ** Sacc. & Roum. Peritheciis gregariis epidermide denigrata atque maculosa velatis, globoso-depressis; spermatiis oblongis, 8 \approx 3, biguttulatis, hyalinis. — In petiolis Paulowniæ imperialis, in horto Garrenne de Nerac, aut. 1879. R.
1391. **Phoma** (Diaporthe) **quercina** Sacc. & Roum. Peritheciis laxe gregariis, subcutaneo-erumpentibus, globoso-depressis, breve papillatis, nigris, contextu minute parenchymatico; spermatiis fusoideis, acutis, 8-9 \approx $2\frac{1}{4}$, biguttulatis, basidiis e strato proligero flavicante oriundis, bacillaribus, quandoque furcatis, 20-25 \approx 3, suffultis. — In ramulis tenellis quercinis, Francheville, prope Lyon, Majo 1979. T.
1392. **Phoma** (Diaporthe) **Phaseoli** Desm. f. **Lepidii**. In caulis Lepidii graminifolii. R. (384). — Spermatia teretiuscula, utrinque rotundata, 7 \approx 3, 2-guttata, hyalina, nonnumquam medio lenissime coarctata.
1393. **Phoma** (Diaporthe) **Spirææ** Desm. In caulis putrescentibus Spirææ Arunci. R. (275). — Spermatia fusoidea, 10 \approx 3, 2-guttulata, hyalina, basidiis bacillaribus subæquilongis suffulta.
1394. **Phoma** (Diaporthe) **Dulcamaræ** (Nitschke) Sacc. Mich. II. 272. In caulis Solani Dulcamaræ. R. (296).
1395. **Phoma** (Diaporthe) **Euphorbiæ** (Cooke) Sacc. Peritheciis gregariis subcutaneis, oblongis, griseo-nigris; spermatiis ovato-oblongis, obtusiusculis, 7 \approx 3- $3\frac{1}{2}$, 2-guttulatis, basidiis fasciculatis acicularibus paulo

- longioribus suffultis. — In caulis Euphorbiæ Chraciæ. **R.** (94).
1396. **Phoma** (Diaporthe) **Rhois** (Nitschke) Sacc. In ramis Rhois Cotini emortuis. **R.** (329). — Spermatia oblongo-teretiuscula, $10 \approx 2-2\frac{1}{4}$, 2-guttulata, basidiis filiformi-hamatis, $25 \approx 1$, suffulta, hyalina.
1397. **Phoma** (Diaporthe) **linearis** (Nees, Nke) Sacc. — In caulis Solidaginis Virgaureæ. **R.** (310). — Spermatia fusoidea, $10-12 \approx 2$, 2-guttulata, hyalina, basidiis bacillaribus $20 \approx 1\frac{1}{2}$, suffulta.
1398. **Phoma** (Diaporthe) **Arctii** (Lasch.) Sacc. In caulis Lappæ majoris putrescentibus. **R.** (272). — Spermatia oblongo-ellipsoidea, $7 \approx 3-3\frac{1}{2}$, biguttulata, hyalina, basidiis filiformi-arcuatis, $25 \approx 1\frac{1}{2}$, suffulta.
1399. **Phoma** (Diaporthe) **conegeланensis** Sacc. Peritheciis subcutaneis, gregariis, oblongis, spermatiis oblongo-fusoideis, $7-8 \approx 3$, biguttulatis, hyalinis, basidiis acicularibus, $15 \approx 3$, suffultis. — In petiolis ramulisque *Æsculi Hippocastani*. **Mb.**
1400. **Phoma** (Diaporthe) **scabra** (Nitschke?) Sacc. Peritheciis dense gregariis globoso-depressis, subcutaneo-erumpentibus, olivaceo-faretis; spermatiis breve fusoides, acutiusculis, $7-8 \approx 2-2\frac{1}{2}$, biguttulatis, hyalinis, basidiis filiformibus, curvis duplo longioribus suffultis. — In ramis corticatis *Platani*, *Lyon*. **T.** (4609).
1401. **Phoma** (Diaporthe) **velata** (Nitschke) Sacc. — In ramis Tiliæ europeæ. **B.** (147). — Spermatia breve fusoidea, $7-7\frac{1}{2} \approx 1\frac{3}{4}-2$, biguttulata, hyalina, basidiis bacillaribus brevibus $10-14 \approx 1$, suffulta.
1402. **Phoma** (Diaporthe) **Escalloniæ** Sacc. Peritheciis gregariis subcutaneis, oblongis, griseis; spermatiis ova-to-oblongis, $7 \approx 2$, biguttatis, hyalinis, basidiis acicularibus $15 \approx 1$ suffultis. — In ramis corticatis *Escalloniæ*. **L.** (1406).
1403. **Phoma** (Diaporthe) **Malvacearum** West., nec Sacc. Mich. I. 258. **F. G.** 719 (*Sphaeropsis*). — In caulis Malvæ sylvestris, *Collioure*. **R.** — Perithecia subcutanea, oblonga; spermatia fusoidea, obtusiuscula, $7-8 \approx 2\frac{1}{2}-3$, basidiis bacillaribus sesquilonigioribus suf-

fulta. — *Ph. Malvacearum* mea prorsus aliena est nec ut *Diaporthis* spermogonium censeri potest. Hæc *Ph. labilis* dici poterit.

1404. **Phoma** (Diaporthe) **nidulans** Grog. **F. G.** 581 (*Sphæria*). — In ramis corticatis Ampelopsidis hederaceæ, *Pau*. **R.** — Perithecia hinc inde approximata, oblonga, erumpentia, intus grisea; spermatia fu-soidea $8-10 \approx 2\frac{1}{2}$, biguttata, hyalina, basidiis filiformibus $25-30 \approx 1\frac{1}{2}$ fasciculatis e basi proligera lutescenti oriundis suffulta.
1405. **Phoma** (Diaporthe) **Siliquastri** Sacc. Peritheciis dense gregariis, globoso-depressis, subcutaneis vix erumpentibus, griseis; spermatiis oblongo-subfusoideis, $6-7 \approx 2-2\frac{1}{2}$, hyalinis. — In ramulis corticatis *Cercis Siliquastri*. **B.** (170).
1406. **Phoma** (Diaporthe) **Poinsettiæ** Sacc. Peritheciis laxe gregariis, subcutaneis, globoso-oblongis, nigro-olivaceis; spermatiis ovato-oblongis, $6-7 \approx 1\frac{1}{2}-2$, utrinque obtusiusculis, 2-guttulatis, hyalinis, basidiis bacillaribus crassiusculis sesquilonioribus suffultis. — In ramis Poinsettiæ pulcherrimæ emortuis, in calidariis, *Lyon*, Martio 1880. **T.** (4582).
1407. **Phoma Ilicis** Desm. ***Magnoliæ**: spermatiis cylindraceis utrinque rotundatis $15-18 \approx 2\frac{1}{2}-3$, 2-guttulatis, hyalinis, basidiis brevissimis suffultis. — In foliis languidis Magnoliæ grandifloræ. **R.** (24).
1408. **Phyllosticta althæina** Sacc. Mich. I. 143. In foliis languidis Althææ roseæ. **R.** (27). — Spermatia ellipsoidea $6 \approx 3$, biguttulata, hyalina.
1409. **Phyllosticta hedericola** Dur. & Mont. In foliis languidis Hederæ Helicis. **R.** — Spermatia ellipsoidea $5 \approx 3$, hyalina.
1410. **Phyllosticta cruenta** (Fr.) Kickx. **F. G.** 523. In foliis Polygonati multiflori. **M.**
1411. **Phyllosticta ruscicola** Desm. In caulis et cladodis Rusci aculeati. **Mb.** (111).
1412. **Phyllosticta evonymella** Sacc. Mich. I. 138 *Sphæria Evonymi* Kze. **F. G.** 575. — In foliis Evonymi europæi in sylva *Thury* in Valesia, DE LA CROIX. **M.**

- (301). **Phyllosticta osteospora** Sacc. In foliis languidis Mori v. Rhamni. **R.** (73).
1413. **Phyllosticta Haynaldi** Roum. & Sacc. Maculis epiphyllis vagis vinoso-roseis; peritheciis dense gregariis, lenticularibus, $\frac{1}{8}$ mill. diam., poro pertusis, epidermide velatis; spermatiis ovoideis, 5×2 , minutissime biguttulatis, hyalinis. — In foliis Ilicis Aquifolii cultæ, *Bagnères de Luchon*, hieme 1879. **R.** (320).
1414. **Phyllosticta Ruborum** Sacc. Maculis epiphyllis, minutis candicantibus saepius prope nervos, peritheciis paucis punctiformibus, lenticularibus, $\frac{1}{10}$ mill. diam.; spermatiis tereti-oblongis, biguttulatis, $5 \times 1\frac{1}{2}$, hyalinis. — In foliis languidis Rubi fruticosi v. affinis. **L.** (1285. 1343). — A *Phyll. rubicola* Rabh. omnino diversa.
1415. **Phyllosticta Scrophulariæ** Sacc. v. **Veronicae speciosæ**. In ejusdem foliis, *Perpignan*, hieme 1879, **DEBEAUX**. — Spermatia ellipsoidea $5-6 \times 3\frac{1}{4}$, quandoque medio lenissime contracta, olivacea.
1416. **Phyllosticta aliena** (Fr.) Sacc. *Perisporium alienum* Fr. **F. G.** 765. — In ramulis vivis *Evonymi europæi*. **M.** — Maculae albicantes; perithecia gregaria, punctiformia 80–90 micr. d., pertusa; spermatia oblongo-ovata, $7-8 \times 3\frac{1}{2}$, hyalina.
1417. **Cicinnobolus Cesatii** deBary. In foliis *Lycii europæi*. **R.** (167).
1418. **Sphæronema** (*Ceratostoma*) *piliferum* Sacc. Peritheciis gregariis, superficialibus globulosis, exiguis, in ostium filiforme duplo longius productis; spermatiis ovoideis, $3 \times 1\frac{1}{4}$, hyalinis, copiosissimis, mox ad apicem ostioli conglobatis. — In cortice interiore *Pini*, **T.** (4936). — Est spermogonium *Ceratostomatis piliferi*, cuius vero asci nondum innotuerunt.
1419. **Libertiella malmedyensis** Speg. & Roum. **F. G.** 671 et Rev. Mycol. 1880 p. 21. — In thalli hypophyllo *Peltigeræ polydactylæ*. **Lb.** — *Phoma Versonianæ* meæ analoga videtur.
1420. **Fuckelia Ribis** Bon., Karst. Myc. Fenn. I. 215-216. *Cenangium repandum* Fr. **F. G.** 541. — In ra-

mis Ribis petræi in monte *Hohnek*, vere. **M.** — Est spermogonium *Cenangii Ribesii* (Pers.)² Fr. Conceptacula intus in locellos angulosos numerosissimos partita; spermatia ovoideo-oblonga, 8 ~ 4, crasse 2-guttata, simulateque 1-septata, hyalina.

1421. **Dothiorella gregaria** Sacc., *D. Bérengeriana* Sacc. in Rev. Mycol. 1880 p. 190, ex errore, nec Michel. II. 271. — Peritheciis subcutaneo-erumpentibus, in acervulis hinc inde aggregatis v. *gregariis*, intus pallidis; stylosporis oblongo-fusoideis, 18–22 ~ 6–6½, nubilosis, hyalinis, basidiis acicularibus, 25–30 ~ 3 suffultis. — In ramis corticatis Populi canadensis. **R.** — Forte pycnidium *Physalosporæ gregariæ* Sacc.

Allantosporæ

- (309). **Vermicularia Dematium** (Pers.) Fr. In caulis Chærophylli (*Pustularia trichophora* Pers. **F. G.** 748 et **R.** (382). — *Tecomæ* **R.** (395). — *Heraclei* **T.** (5060), — *Hederæ* **Mb.** (159). — *Periclymeni* **F. G.** 720. **M.** — in foliis Nerii **R.** (404). — var. *macrospora*: spermatiis curvo-fusoideis, 30 ~ 4, pluriguttulatis hyalinis, basidiis teretibus 15 ~ 3 obtusiusculis suffultis. — In petiolis Æsculi Paviæ, *Toulouse*, hieme 1879. **R.** — var. *samaricola*: peritheciis solito majoribus; spermatiis 20–22 ~ 3½, pluriguttulatis hyalinis. — In samaris (exclusis alis) *Fraxini*. **R.** (10).

- (311). **Vermicularia Lilicearum** West. var. *Amaryllidis*. **F. G.** 520. — In scapis Amaryllidis Belladonnæ, *Autun*, GROGNOT. — *Iridis* **F. G.** 684, *Mende*, PROST et **R.** (51).

1422. **Vermicularia Colchici** Fuck. f. *Bromeliæ*. **F. G.** 696. In ejusdem foliis, *Marseille*. **R.**

- (312). **Vermicularia trichella** Fr. f. *Hederæ*. In ejusdem foliis. **R.** (366). — f. *Ari italicæ*. In ejusdem foliis. **B.**

1423. **Vermicularia Dianthi** West. In caulis foliisque

Dianthi superbi. R. (389) et D. sinensis.
Mb.

1424. **Cytispora** (Eutypella) **ventricosa** Fuck. Symb. Mycol. 195 ad *Valsam*. In ramis denique decorticatis quercinisi. R. (107). — Conceptacula conoidea, majuscula, intus pluri-locellata, olivaceo-nigra; spermatia allantoidea, minuta, 4 ~ 1, hyalina.
1425. **Cytispora** (Eutypa) **heteracantha** Sacc. In ramis corticatis *Juglandis* regiae. R. (220). — Spermatia filiformia, curva, 20–25 ~ 1.
1426. **Cytispora** (Euvalsa) **chrysosperma** Fr. F. G. 519. — In ramis corticatis populneis. M. et R. (216 A. B.). — Spermatia allantoidea, 4 ~ 1, hyalina.
1427. **Cytispora** (Leucostoma) **nivea** (Hoffm.). In ramis *Populi tremulæ*. R. (188 B. C.). — Spermatia allantoidea, 6–7 ~ 1 $\frac{1}{2}$, hyalina.
1428. **Cytispora Pinastri** (DC.) Fr. F. G. 625 et 583 (*Sphaeria*). — In foliis *Pini sylvestris* et *Abietis excelsæ*. M. Lb.
1429. **Cytispora** (Euvalsa) **Pini** Fuck. In cortice *Pini sylvestris*, *Bagnères de Luchon*, aut. 1878. R.
1430. **Cytispora extensa** Sacc. Conceptaculis gregariis peridermio tectis, globulosis, intus pluri-locularibus, atris, disco vix erumpente; spermatiis allantoideis, curvulis, utrinque rotundatis, 5 ~ 1, hyalinis, basidiis fasciculatis e strato proligero ferrugineo enatis, acicularris, 15 ~ 1 suffultis. — In ramis corticatis *Rhamni alpini*. R. (150 A.). — Forte *Eutypellæ extensæ* (Fr.) spermogonium.
1431. **Cytispora** (Fenestella?) **anceps** Sacc. Conceptaculis gregariis subcutaneo-prominulis, vix erumpentibus, globulosis, intus uni- v. paucilocularibus, olivaceis, $\frac{1}{2}$ mill. d.; spermatiis allantoideis, 6–10 ~ 1, curvulis, hyalinis. — In ramis corticatis *Cerasi* (an potius *Fagi*?) R. (136). — Ob habitum forte *Fenestellæ* spermogonium.
1432. **Cytispora macrobasis** Sacc. Conceptaculis erumpentibus, majusculis, globuloso-aggregatis, vertice saepe obtuse papillatis, astomis, nigris; spermatiis botuliformi-

bus, vix curvulis, 7–8 × 2, 2-guttulatis, hyalinis, basidiis iterato-furcatis, bacillaribus, 60 × 2, hyalinis suffultis. — In ramis corticatis salicinis. **L.** (1326). — Basidiis praelongis mox distinguenda species.

1433. **Fusicoccum quercinum** Sacc. *Cytispora quercina* (West.?) Sacc. Mich. I. 261. — In ramis corticatis Quercus. **R.** (82). — Conceptacula denique perithecio utuntur, intus rosea; spermatia fusoidea utrinque acutiuscula, 15–18 × 3–3½, plasmate quandoque bipartito, hyalina, basidiis fasciculatis paulo brevieribus suffulta. Status, quem l. c. descripsi, immaturus videatur, ceterum species eadem. Descriptio *Cyt. quercinae* West. (Lamb. Myc. Belg. III. 150) speciem diversam spectat.

Scolecosporæ

1434. **Septoria arundinacea** Sacc. ***rhizomatum**: spermatiis bacillaribus 50–70 × 3⅓–4⅔, 8–9-nucleatis, subhyalinis. — In rhizomate Arundinis Donacis **R.** (17).

- (864). **Septoria Donacis** Pass., nec Desm. (ut perperam in **F. G.** et Michel. II. 103; nam nulla adest species Desmazierii hujus nominis) *Sept. arundinacea*. **F. G.** 726, nec Sacc. — In foliis Arundinis Donacis, Perpignan, O. DEBEAUX. — Spermatia solito paulo breviora, nempe 20 × 2.

1435. **Septoria Mespili** Sacc. Mich. I. 177. In foliis Mespili germanicæ. **B.** (140). — Spermatia bacillaria, 30–40 × 1½, pluriguttulata, hyalina.

1436. **Septoria Menthae** Sacc. & Let. Maculis minutis, subcircularibus, amphigenis, subochraceis; peritheciis punctiformibus, lenticularibus, pertusis; spermatiis filiformibus, flexuosis, continuis, 30–40 × 1, hyalinis. — In foliis languidis Menthae arvensis v. affinis. **L.** (1344). — *Septoria palustris* meæ Mich. I. 103 mutetur nomen in *Septoriam Lycopi* Pass. quæ jam ab anno 1878 in Hedw. p. 60 describitur.

1437. **Septoria Chelidonii** Desm. In foliis Chelidonii majoris subvivis. **T.** (5132).

1438. **Septoria Fraxini** Fr. **F. G.** 629. In foliis Fraxini excelsioris *Lambersart*, DESMAZIERES.
1439. **Septoria Frangulæ** Guep. **F. G.** 522. In foliis languidis *Rhamni Frangulæ*. **M.** — Maculæ epiphyllæ, minutæ, atro-rufæ, circulo pallidiore cinctæ: peritheia pauca, lenticularia; spermatia bacillaria, longitudine varia, $18-25 \approx 2$, subcontinua, hyalina.
1440. **Septoria Ficariæ** Desm. In foliis *Ficariæ ranunculoidis*. **B.** — Maculæ epiphyllæ cinerascentes, variæ; perithecia lenticularia 70–80 micr. diam. pertusa, contextu parenchymatico, ochraceo-fusco; spermatia filiformia, $30-35 \approx 1-1\frac{1}{4}$, continua, hyalina.
1441. **Septoria rubra** Desm. **F. G.** 731. In foliis *Amygdui communis*, DESMAZIERES. — Est spermogonium *Polystigmatis* et a typo *Septoriæ* non parum deflectit.
1442. **Septoria effusa** (Lib.) Desm. In foliis nondum emortuis *Pruni Cerasi*. **R.** (66). — Perithecia in maculis rufescensibus subgregaria, punctiformia, late hiantia; spermatia bacillaria, curvula, $20-25 \approx 1\frac{3}{4}-2$, spurie 3–4-septata, hyalina.
1443. **Septoria Ebuli** Rob. & Desm. In foliis *Sambuci Ebuli*. **R.** (340). — Spermatia filiformia, $30-40 \approx 1$, continua, hyalina.
1444. **Septoria pyricola** Desm. In foliis *Pyrorum*. **R.** (223).
1445. **Septoria Euphorbiæ** Guep. **F. G.** 521. In foliis *Euphorbiæ Esulæ* languidis. **M.** — Maculæ amphigenæ, subcirculares, minute, sordide olivaceæ; perithecia numerosa punctiformia, late hiantia; spermatia acicularia, sursum attenuata, $40-45 \approx 2-2\frac{1}{2}$, obsolete 3–4-septata, hyalina.
1446. **Septoria Clematidis** Rob. & Desm. **F. G.** 729. — In foliis *Clematidis Vitalbæ*, *Collioure*, Oct. 1879, O. DEBEAUX.
1447. **Septoria Pistaciæ** Desm. **F. G.** 721. In foliis *Pistaciæ veræ*, *Angers*, GUERIN. **M.**
1448. **Septoria Stellariæ** Rob. & Desm. In foliis languidis *Stellariæ mediæ*, *Franchenillæ*. **T.** (5133).

1449. **Septoria Syringæ** Sacc. & Spieg. In foliis languidis Syringæ vulgaris. **B.** — Spermatia bacillaria, 15–18 \times $1\frac{1}{2}$, obsolete uniseptata, hyalina.
1450. **Septoria Ari** Desm. **F. G.** 730. — In foliis Ari maculati languidis, *Lozère*, PROST.
1451. **Septoria sepium** Desm. v. **Soldanellæ**. — In foliis Convolvuli Soldanellæ. **L.** (1406).
1452. **Septoria eupyrena** Sacc. & Th. Peritheciis gregariis epidermide velatis, dein liberis, globoso-depressis, papillatis, $\frac{1}{3}$ – $\frac{1}{2}$ mill. d., contextu parenchymatico solidiusculis; spermatiis bacillaribus vel acicularibus, rectiusculis, 90 \times $1\frac{1}{2}$ –2, hinc inde guttulatis, simula-teque 8–10-septatis, hyalinis. — In caulis Hera-clei *Sphondylii* putrescentibus. **T.** (4941). — A *Septoria pleosporoide* Sacc. differt imprimis sperma-tiis multo longioribus.
1453. **Septoria lacustris** Sacc. & Th. Peritheciis gregariis epidermide jugiter tectis, globosis, lenticularibus, $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{3}$ mill. d., poro pertusis, contextu parenchymatico pure nigricante; spermatiis bacillari-acicularibus, cur-vulis, 75–85 \times 3– $3\frac{1}{2}$, utrinque attenuato-obtusiusculis, initio pluriguttulatis, dein (spurie?) 10–12-septatis e hyalino dilutissime fuscidulis, humiditate mox in cirrhos filiformes, spiraliter tortos fumosos eximie protrusis. — In calamis *Scirpi lacustris* diu aqua immersis. **T.** (4887).
1454. **Septoria Tritici** Desm., Sacc. Mich. I. 194. — In foliis *Glyceriae fluitantis* languidis. **B.** (155). Spermatia tereti-fusoidea, leniter curva, 60–65 \times $3\frac{1}{2}$ – $4\frac{1}{2}$, 5-septata, hyalina.
1455. **Septoria pleosporioides** Sacc. In caulis So-lidaginis *Virgaureæ*. **Mb.** (116). — Spermatia bacillaria 35–40 \times 1, guttulata, hyalina. Forma, quam enumeravi sub hoc nomine (*Fungi gallici*, Series I. n.º 280 in Mich. I. 528) non parum recedit sperma-tiis brevioribus et crassioribus: hæc *S. Bosciana* di-cenda.
1456. **Septoria Delphinella** Sacc. Maculis amphigenis, fusco-olivaceis; peritheciis subsparsis, punctiformibus,

lenticularibus, pertusis, 120 micr. d., contextu distinete parenchymatico, fuligineo; spermatiis acicularibus, curvulis, 45-50 = 2, obsolete 3-septatis, deorsum crassioribus, hyalinis. — In foliis *Delphinii Ajacis* nondum emortuis. **B.**

Quoad *Septoriam Elaeagni* **F. G.** 724, *Sept. oleandrinam* **F. G.** 727, *Sept. Violæ* **F. G.** 725, *Ascosporam Smilacinam* **F. G.** 796, *Sept. Solani* **F. G.** 722, *Sept. Vitis* **F. G.** 728, ob imperfecta specimina nil certi eruere potui.

Phæosporæ

1457. *Sphæropsis?* dothideooides Sacc. & Roum. Stomatibus pulvinatis epidermide atro-nitida velatis, intus peritheciis?; stylosporis e globoso ellipsoideis, 20 = 17, biguttatis, ochraceo-fulvis. — In costa foliorum Chamaeropis humilis, socia *Leptospheria Debeauxii*, *Alger*, O. DEBEAUX. — Fungus anceps in statu perfecto denuo explorandus.

(886). *Chætomella atra* Fuck. **F. G.** 675. In foliis *Caricum*. **Lb.** et in foliis *Maydis*. **R.** (90). — Spermatia tereti-fusoidea 15 = 2-2 $\frac{1}{2}$ olivacea, basidiis filiformibus, nonnumquam usque 60 = 1, suffulta.

Didymosporæ

1558. *Diplodia Rhododendri* Desm. **F. G.** 517 p. p.
— In ramulis *Rhododendri* pontici, socia *Phoma Rhododendri*, Martio 1879, *Tarbes*. **R.** — Stylosporæ ovato-oblongæ 20 = 10-11, constricto-uniseptatae, atro-fuligineæ; perithecia gregaria, subcutanea.

1459. *Diplodia sapinea* (Fr.) Fuck. **F. G.** 584 (*Sphaeria pinea*). — In cortice *Pini sylvestris*, *Lavardac*, aut. 1878. **R.** — f. *lignicola*. In ligno pineo diu aqua submerso. **R.** (230. 232).

1460. *Diplodia conigena* Desm. In strobilis dejectis *Pini sylvestris*. **L.** (1308).

1461. **Diplodia Scheidweileri** (West.) Sacc. *Sphaeropsis Scheidweileri* West., Kickx Flandr. I. 401. — In ramis Tiliæ europeæ, Majo 1879. **R.** (111). — Stylosporæ diu continuæ hyalinæ, denique constricto-biloculares, 25 ~ 15, fuligineæ, stipitellatae.
1462. **Diplodia Evonymi** West. In foliis Evonymi japonici dejectis. **R.** (363. C.). — Stylosporæ 25–30 ~ 10–12, tandem 1-septatae, fuligineæ.
- 1463 **Diplodia Cydoniæ** Sacc. Mich. II. 269. In ramulis Cydoniæ vulgaris. **B.** (161).
1464. **Diplodia Secalis** (Lib.) Speg. & Roum. **F. G.** 613. — In culmis putrescentibus Secalis Cerealis. **L.** — Stylosporæ didymæ, raro continuæ, 6–8 ~ 3–4, fuligineæ.
1465. **Diplodia Mori** (Chaill.) Auersw. In ramis crassioribus Mori spec. **R.** (116). — Forma peritheciis subaggregatis; stylosporis ovato—oblongis, 1-septatis, 25 ~ 10–11, fuligineis.
1466. **Diplodia Frangulæ** Fuck. **alpina*: peritheciis hinc inde aggregatis, erumpentibus; stylosporis ovoides, deorsum acutiusculis, 15–16 ~ 8, uniseptatis, olivaceo-fuligineis, initio stipitellatis. — In ramis corticatis Rhamni alpini. **R.** (130).
1467. **Diplodia viticola** Desm. In sarmentis emortuis Vitis viniferae. **R.** (302). — Stylosporæ ovato—oblongæ, 20–22 ~ 12, uniseptatae, atrofuligineæ.
1468. **Diplodia myxosporioides** Sacc. Peritheciis gregariis, diu peridermio velatis, denique sub-erumpentibus, globulosis depresso, $\frac{1}{3}$ mill. diam., vix papillatis; stylosporis oblongis, utrinque rotundatis, constricto—1-septatis, 22 ~ 15, granulosis, olivaceo-fuligineis, initio basidiis crassiusculis subæquilongis, hyalinis suffultis. — In cortice Platani, Majo 1880. **T.** (4997). — Habitu *Myxosporii* sed peritheciū adest sporæque biloculares.
1469. **Diplodia ascochytula** Sacc. Peritheciis gregariis et hinc inde in cespitos aggregatis, subsuperficialibus globoso-lenticularibus, 80 micr. d. pertusis; stylosporis breve fusoideis, 8–9 ~ 2 $\frac{1}{2}$ –3, utrinque obtusiusculis,

olivaceis. — In sarmentis decorticatis et saepius infuscatis Lonicerae Periclymeni. **Mb.** (167). Habitus *Diplodiæ*, sed characteres potius *Ascochytae*.

1470. **Ascochyta graminicola** Sacc. Michel. I. 127.

***Holci**: spermatis quam in typo longioribus et angustioribus, nempe fusoideis $16-18 \times 3-3\frac{1}{2}$, leniter constrictis, minute 4-guttulatis, hyalinis; peritheciis lenticularibus, pertusis, 100 micr. diam., saepius inter nervos seriatis. — In foliis Holcli lanati. **Mb.** (174).

1471. **Darluca Filum** (Biv.) Cast. In foliis Cytisi Laburni, socio *Uromycete Laburni*. **R.** (35).

Quoad *Ascochytam Robiniae* **F. G.** 723 et *A. Wisteriae* **F. G.** 732, ob imperfecta specimina, characteres eruere non potui.

Phragmosporæ

1472. **Hendersonia aquatica** Sacc. ***H. junciseda**.

A typo differt peritheciis duplo majoribus prominulis; stylosporis angustioribus et utrinque acutioribus, nempe $25-30 \times 3-3\frac{1}{2}$, triseptatis, non constrictis hyalinis. In calamis Junci effusi v. affinis, *mare de l'Etoile*, Lyon. **T.** (**R.** 26). — ***H. lacustris**: peritheciis gregariis globoso-depressis, subcutaneis, vix papillatis, $\frac{1}{5}$ mill. d.; stylosporis fusoideis, subacutis, $26 \times 3\frac{1}{2}$, triseptatis, non constrictis, e chlorino hyalinis. — In calamis Scirpi lacustris, Lyon.. **T.** (4888).

1473. **Hendersonia vexatula** Sacc. Peritheciis gregariis, innato-erumpentibus, globoso-conoideis, $\frac{1}{5}$ mill. d., nigris, duriusculis; stylosporis cylindraceis, utrinque rotundatis, $35-38 \times 4\frac{1}{2}-5$, quinque-septem-nucleatis, hyalinis. — In culmis Phragmitis communis emortuis. **B.** (164). — Ab *H. vexata* Sacc. (Mich. I. 211, II. 112) differt stylosporis multo minoribus.

1474. **Hendersonia maculans** (Corda) Lév., *Sporocladus maculans* Corda. — In pag. inf. foliorum Quer-

cus Ilicis. R. (93). — Peritheciæ contextus e celulis oblongis fuligineis constans; stylosporæ fusoideæ, utrinque acutiusculæ, 20–22 × 6–7, fuligineæ, basidiis bacillaribus 25 × 1 $\frac{1}{2}$, hyalinis suffulta.

1475. *Hendersonia neglecta* West. Cooke Grev. 1880 p. 83. *Sporocadus Arundinis* Lib. F. G. 695. — In culmis Phragmitis communis. Lb.

Dictyosporæ

- (947). *Camarosporium Roumeguéri* Sacc. f. *Kochiæ scopariæ*. F. G. 514 (*Phoma atriplicina*). In caulinis Kochiæ, Vinçà (*Pyr. Orient.*), Junio 1879. R. — Stylosporæ 12–15 × 8–10, varie 2–4-clathrato-septatae, fuligineæ, basidiis filiformibus simplicibus ramulosisve 20–25 long. suffultæ.
1476. *Dichomera Saubinetii* (Mont.) Cooke. In ramis corticatis Rhamni Frangulæ. R. (85) et Quercus. T. (5280).

Ser. 2. DIMIDIATO-SCUTATÆ.

1477. *Leptothyrium Rubi* (Duby) Sacc. *Sphaeria* (Dothidea) *Rubi* Duby. F. G. 787. — In utraque pagina foliorum languentium Rubi. M. — Perithecia clypeata, radiato-contexta, areolis foliorum dealbatis insidentia, 150 micr. diam.; spermatia teretiuscula, 4–4 $\frac{1}{2}$ × $\frac{3}{4}$, hyalina, basidiis bacillaribus, interdum ramulosis(?) 20 × 1–2 suffulta. Species *Leptothyrio clypeosphaeroide* Sacc. multo minor.
- (951). *Leptothyrium punctulatum* Sacc. Mich. II. 113. In caulinis Dentariæ pinnatæ, Grande Chartreuse, Mayo 1880. T. (4952).
1478. *Leptothyrium protuberans* (Lév.) Sacc. *Phoma protuberans* Lév. F. G. 516. — Pseudoperitheciū clypeato-convexum, majusculum, 1 mill. d., atro-nitidum ab epidermide fungificata formatum; spermatia fusoidea, curva, 8 × 1 $\frac{1}{2}$, hyalina. — Species *Lept. macrothecio* Fuck. peraffinis.

1479. **Leptothyrium pictum** B. & Br. In foliis Lonicerae Xylostei languidis, Lyon, Oct. 1880. **T.** (5245).
1480. **Leptostroma herbarum** Fr. f. **Salicis**. **F. G.** 609. — In ramulis Salicis Capreæ. **Lb.** — f. **Teucrii**. **F. G.** 610 (*Lept. vulgare*). — Ad caules Teucrii Scorodoniae. **Lb.** — In hoc spermatia botuliformia 4–5 × 1 hyalina observavi, non vero globulosa ut in M. U. n.º 1576 dicuntur.
1481. **Leptostroma Spirææ** Fr. **F. G.** 512. In caulis Ulmariæ exsiccatis. **M.** — Perithecia minuta subhysterioidea (non radiato-contexta); spermatia fallata, 6 × $\frac{3}{4}$ –1, hyalina, utrinque acuta.
1482. **Leptostroma?** **Rubi** (Lib.) Speg. & Roum. **F. G.** 611. — In ramis Ruborum. **Lb.** — Potius *Phoma*; describitur enim perithecium globosum, poro pertusum; spermatia cylindracea, pluriguttulata, utrinque rotundata, 8–10 × 2, hyalina.
1483. **Leptostroma Juncacearum** Sacc. Perithecia plano-clypeata, ovata, atronitidula $\frac{1}{2}$ mill. long. rimula obsoleta percursa, contextu parenchymatico non radiato; spermatiis copiosis, tereti-fusoideis, 4 × $\frac{1}{2}$, obsolete 2-guttulatis, hyalinis basidiis bacillaribus dense fasciculatis, 10 × 1–1 $\frac{1}{2}$, hyalinis suffultis. — In calamis emortuis Junci conglomerati v. affinis *Quevilly*, Ronen. **Mb.** (151. 164) et in foliis Luzulæ sylvaticæ, Oct. 1880, *Francheville*. **T.** (5237). — An hoc spectet *L. Luzulæ* Lib., deficientibus exemplaribus dijudicare nequeo. Certe quod describitur in Lamb. Myc. Belg. III. 105 alienum est. *L. juncinum* Fr., Sacc. Mich. II. 282 quoque prorsus differt. Quod sub hoc postremo nomine accepi a nonnullis mycologis potius *Phyllachoræ Junci* (Fr.) initia sistit.
1484. **Leptostroma Donacis** Sacc. Peritheciis lineolatim et parallele dispositis, innato-erumpentibus, anguste oblongis $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ mill. long. $\frac{1}{10}$ cr., nigris, rimula perexigua; spermatiis tereti-oblongis, teretiusculis, 4 × 1, hyalinis. — In culmis Arundinis Donacis emortuis. **R.** (91). — *Lept. Phragmitis* Fr.? (in Kl. Herb. Myc. a me non viso) maxime differt peritheciis multo majo-

ribus, 1- $1\frac{1}{2}$ mill. long., $\frac{1}{3}$ cr., distincte rimosis, spermatisis fusoideis, majusculis, 15-20 $\approx 3\frac{1}{2}$ -4, 4-guttulatis, curvulis, hyalinis. — Hoc in culmo Phragmitis prope Kappel misit cl. Doct. P. MAGNUS.

1485. **Leptostroma virgultorum** Sacc. Peritheciis sub-superficialibus, plano-clypeatis, oblongis, atronitentibus, rimula spuria exaratis; spermatisis tereti-oblongis, 4-5 \times 1, hyalinis, basidiis filiformibus fasciculatis 20-25 \times 1 suffultis. — In sarmenis emortuis Rubi fruticosi. L. (1360). — Certe spermogonium *Hypoderma tis virgultorum* f. *Rubi*, totoque cœlo diversum a *Lept. vulgari* (Cfr. Tul. Carp. et Fuck. Symb. 258).

1486. **Leptostroma Pinastri** Desm., nec Sacc. Mycol. Ven. Specim. p. 190 quod *Phoma acicola* (Lév.). — In foliis Pini maritimæ. L. (1171). — Perithecia anguste linearia, parallela, 1 $\approx \frac{1}{8}$ mill.; spermata cylindracea, minuta, 8 $\approx \frac{1}{2}$ hyalina, basidiis subæquilonigis fasciculatis suffulta.

1487. **Leptostroma** (*Leptostromella*) **pteridinum** Sacc. & Roum. Peritheciis elongatis applanatis, initio epidermide velatis dein sub-superficialibus, mill. $1\frac{1}{2}$ long., $\frac{1}{2}$ cr., nigris, non sulcatis; spermatisis filiformi-acicularris, 80 $\approx 1\frac{1}{2}$, hyalinis, 5-6-septatis. — In stipitibus Pteridis aquilinæ, socia *Didymella Hyphene* (Cooke) in *Algeria*, Doct. TRABUT. — *Leptostromella* est quasi Leptostroma sed spermatisis bacillaribus ornata.

1488. **Placosphaeria Onobrychidis** (DC.) Sacc. In foliis Lathyri sylvestris nondum emortuis. L. (1324).

1489. **Placosphaeria Stellatarum** Sacc. Stromatibus amphigenis, minutis subcircularibus, $\frac{1}{2}$ mill. d., nigris, intus plurilocellatis basi hyphulis fuscis vestitis; contextu parenchymatico, fuligineo; spermatisis bacillaribus, 30-40 $\approx 1\frac{1}{2}$ -2, utrinque obtusiusculis, 5-6-guttulatis, hyalinis. — In foliis nondum emortuis Galii v. Sherrardiae. B. (H. K.). — *Phyllachora punctiformis* Fuck. longe differt.

Ser. 3. SUBCUPULATE.

1490. **Dinemasporium hispidulum** (Schrad.) Sacc. In ligno putri fagineo. **R.** (269).
1491. **Schizothyrella quercina** (Lib.) Thuem. M. U. 1684. *Schizothyrium quercinum* Lib. **F. G.** 612. — In foliis quercinis frigore necatis, **Lb.** — Excipuli contextus parenchymaticus fuligineus, distinctus. Spermatia in catenulas longissimas digesta, cylindrica utrinque obtusa, $15 \times 1\frac{1}{2}$, quadrilocularia, loculis ipsis denique secedentibus, $4 \times 1\frac{1}{2}$, hyalina. Fungus singularis ob fructificationem ad *Blennoriam Buxi* Fr. et *Leptothyrium? botryoides* Sacc. accedens.

Melanconieæ

Hyalosporæ

1492. **Myxosporium incarnatum** (Desm.) Bon. In ramis corticatis *Rhamni* (?), Lyon, Majo 1880. **T.** (4004).
1493. **Myxosporium deplanatum** (Lib.) Sacc. **F. G.** 630 (*Melanconium deplanatum*). In ramulis emortuis *Carpini Betuli*. **Lb.** — Conidia tereti-elliptica, utrinque obtusiuscula, 10–14 × 3–4, continua (rarissime uniseptata) fumose hyalina.
1494. **Gloëosporium lagenarium** (Pass.) Sacc. & Roum. In epicarpo et caule *Cucumeris Melonis*, *Toulouse et Paris*, æstate 1880. **R.** — Cfr. Mich. II. 283. — An hue quoque *Gloëosp. orbiculare* Berk. (Just B. J. 1876 p. 1274) spectat?
1495. **Gloëosporium ampelophagum** (Pass.) Sacc. **F. G.** 736. — In foliis *Vitis viniferæ*, dans le *Charente inferieure*, æstate 1879. **B.**
1496. **Gloëosporium intermedium** Sacc. Mich. II. 118. f. **Poinsettiæ**: conidiis oblongis utrinque rotundatis, 18–20 × 5–6; basidiis crassiusculis brevibus, 12–15 × 4, suffultis. — In ramis *Poinsettiæ pulcherrimæ* in calidariis. **T.** (4583).

Phæosporæ

1497. **Thyrsidium botryosporum** Mont. In cortice *Carpini Betuli*. **R.** (l. 81).

1498. **Melanconium Desmazierii** (B. & Br.) Sacc. *Discella Desmazierii* B. & Br. — In ramis corticatis emortuis Tiliæ, Lyon, Majo 1880. **T.** (4903). — Acervuli subcutanei, depresso-pulvinati, absque perithecio, nigri, non vel vix erumpentes; conidia breve fusoides utrinque obtusiuscula, 30-35 ~ 6-10, amoena azurrea, triguttulata, basidiis filiformibus, saepius furcatis, 50-60 ~ 1 $\frac{1}{2}$, hyalinis suffulta.

Didymosporæ

1499. **Marsonia truncatula** Sacc. Mich. I. 221 (Gloeosporium). — In foliis languidis Aceris Negundi-nis. **B.** (172).

Phragmosporæ

1500. **Coryneum Corni-albæ** (Roum.) Sacc. **F. G.** 571 (*Sphaeria*). — Acervulis gregariis innato-erumpentibus, pulvinatis, $\frac{1}{2}$ -1 mill. d., denique epidermide erupta cinctis; conidiis oblongis utrinque acutiusculis, 20-22 ~ 9, triseptatis, non constrictis, totis fuligineis, basidiis filiformibus 18-20 ~ 1 suffultis. — In ramis Corni albae emortuis, Perpignan, Sept. 1878. **R.**

1501. **Coryneum Kunzei** Corda, Sacc. Mich. II. 169. **F. G.** 524 (*C. disciforme* Nees) et 634. — In ramis corticatis quercinisis. **M. Lb.**

1502. **Pestalozzia pezizoides** DNtrs. In lignis putrescentibus (Juglandis?) Lyon, Apr. 1880. **T.** (4810).

1503. **Scolecosporium Fagi** Lib. **F. G.** 676. — *Coryneum macrosporum* Berk., *Sporidesmium vermiforme* Riess. In cortice fagineo socia *Massaria macrospora* (Desm.) cuius est status conidiophorus, *Malmedy*. **Lb.** — Conidia fusoides 100 ~ 15, fuliginea sursum incurvo-attenuata subhyalina, 7-8-septata, guttulataque, breve, crassiuscule stipitata. — Etsi species jam edita, genus *Libertianum* servandum censeo, nam a *Coryneo* differt conidiis hyalino-rostratis, brevissime stipitatis; a *Sporodesmio* praesentia stromatis etc. etc.

PROSTHEMIELLA Sacc. nov. gen. Conceptacula innata, dein erumpentia, perithecio vero destituta; conidia copiosissima cylindracea, deorsum crassiora, plura basi (*Prosthemii* ad instar) stellatim connata, hyalina, septulata. — A *Prosthemio* defectu peritheciis, conidiis hyalinis &c. facile dignoscitur.

1504. **Prosthemella formosa** Sacc. & Malbr. Conceptaculis convexo-pulvinatis, diu peridermio tectis dein irregulariter erumpentibus, basi nigricantibus, disco amoena aureis, $\frac{3}{4}$ -1 mill. d., conidiis 3-8 stellatis, obclavatis, 40-45 \approx 4, deorsum septulatis et saepe torulosis, granulosis, hyalinis, cellula centrali varie angulosa. — Ad ramos fagineos, *Brionne*. **Mb.** (152). — Fungus cum nullo commutandus! — *Prosthemium formosum* Lib. Herb. n.^o 601 hoc spectat.

Scoleco-allantosporæ

(991). **Næmaspora croceola** Sacc. In cortice quercino et fraxineo. **R.** (159. 174. 251). — Basidia in forma *Quercus* 20-25 \approx 1, in forma *Fraxini* 15 \approx 3; spermatia in utraque 4-5 \approx $\frac{3}{4}$ -1.

1405. **Cylindrosporium Ranunculi** (Bon.) Sacc. f. *Calthæ*. — In ejusdem foliis languidis, *Saintes*. **B.**

1506. **Blennoria Buxi** Fr. **F. G.** 593. — In foliis languidis Buxi semperfurentis, *GUEPIN*. **M.** — Conceptacula dein erumpentia epidermideque laciniatâ cincta, compactiuscula, argillaceo-fusca, $\frac{3}{4}$ -1 mill. d.; basidia prælonga, filiformia, iterato dichotome ramosa sursum in conidia cylindrica, utrinque truncata, 12-15 \approx $2\frac{1}{2}$ -3, biguttulata, hyalina, catenulata abeuntia.

Hymenomyceteæ

Mucedineæ

MICRONEMÆ

Oo-bactrosporæ

1507. **Bacillus Anthracis** Cohn. **F. G.** 800. — In sanguine Bovis Tauri anthrace infecti, 1878. —

Conidia cylindrica utrinque truncatula, 5–6 $\times \frac{1}{2}$, hyalina, in catenulas digesta. — Ut notum est fungi hujus-
cetodi ad familiam propriam *Schizomycetum* ducun-
tur; et revera, licet characteribus ad *Cylindria* acce-
dant, tota biologia differunt.

1508. **Microstroma leucosporum** (Mont.) Niessl. In pag. inferiore foliorum Juglandis regiae. **R.** (22. 168). — Conidia breve fusoidea, 8 \times 3, hyalina.

1059. **Oospora rhodella** Sacc. & Th. Cespitulis spar-
sis, gregariis minutis, planis, dilute roseis; hyphis fili-
formibus vase ramosis, sporophora teretiuscula brevia
hinc inde exerentibus; conidiis breve fusoideis, obtu-
siusculis, 4–5 $\times 1\frac{1}{2}$ –2, e hyalino roseis, catenulatis,
mox secedentibus. — In cortice interiore Pinii, Lyon.
T. (4996). — Peraffinis *O. hyalinulae* Sacc., a qua
colore et situ præcipue differt.

1510. **Oospora? Uredinis** (Link.) Wallr. In pag. in-
feriore foliorum Rubi una cum *Uredine*, **Mb.** (120).
— An productio erineacea sit dubium manet.

Phragmospora

1511. **Septocylindrium Bonordenii** Sacc. ***S. minu-**
sculum: conidiis quam in typo paulo minoribus, nem-
pe 20–25 \times 3–3 $\frac{1}{2}$, lenissime curvis, 3-septatis, 4–6–
guttulatis, hyalinis. — In calamo putri et udo Scir-
pi, Lyon, Majo 1880. **T.** (4994).

MACRONEMEÆ

Oospora

1512. **Oidium Passerinii** A. Bert. fil. in N. G. Bot.
Ital. 1879. — In foliis Lauri lusitanicæ. **R.** (332).
1513. **Verticillium Buxi** (Link.) Sacc. **F. G.** 528 (*Fu-*
sidium). — In pag. inferiore foliorum Buxi semper-
virentis, *Melun*, ROUSSEL.
1514. **Verticillium nanum** B. & Br. In Corticio la-
cteo ad *Ailanthum*. **R.** (247). — Hyphae rami-
spurie verticillati, saepius apice furcati; conidia ovato-
oblonga, 3 \times 1, cum tota planta albo-hyalina.

1515. **Verticillium Candelabrum** Bon. In foliis emortuis putrescentibus Magnoliæ grandifloræ. **R.** (36). — Conidia ovoidea $4\text{--}4\frac{1}{2}$ \times 3, hyalina; cæspites latiusculi, candidi, depresso-velutini.
1416. **Botrytis vulgaris** (Pers.) Fr. ***condensata**: cæspitulis suberumpentibus, condensatis, griseis; conidiis 10–12 \times 9–10. — In stromate Tuberulariæ v. affinis in Platano, Lyon. **T.** (4897).
1517. **Botrytis carneæ** Schum. In foliis putridis querçinæ. **T.** (5092). — Conidia asperula, globosa, rosea, $4\frac{1}{2}\text{--}5$ micr. diam.
1518. **Botrytis reptans** Bon. In cortice interiore Populi putrescente, Lyon, Majo 1880. **T.** (4979). — Hyphæ expansæ, sursum assurgentæ, sæpe furcatæ, septulatæ, hyalinæ, 3–4 micr. cr.; conidia ad apices ramorum inserta, globosa, $2\frac{1}{2}$ micr. d. hyalina. Cæspites latiusculi, albi, initio pulveracei, dein compactiusculi.
1519. **Botrytis fulva** Link. In ramis putridis querçinæ. **R.** (21). — Conidia globosa, $4\frac{1}{2}\text{--}5\frac{1}{2}$ micr. d., asperula, fulva.
1520. **Botrytis geniculata** Corda. In ligno putri querçino. **R.** (356). — Conidia oblongo-ovoidea, 6–8 \times 4, olivaceo-argillacea.
1521. **Botrytis gemella** (Bon.) Sacc. *Phymatotrichum gemellum* Bon. Handb. fig. 138. — In cortice duriore Populi nigræ. **R.** (123); in ligno pineo. **R.** (212). — Conidia in hypharum ramorum apice bifurcato, parum incrassato atque muriculato congregata, ellipsoidea, 6–5, vel (in forma pinea) globosa 6–7 micr. d. subhyalina.
1522. **Botrytis cinerea** Pers. ***sclerotiphila** (Kl.) *Polyactis sclerotiphila* Kl. H. M. 1668. — In Sclerotio duro ad caules Umbelliferarum. **G.** (1). Hyphæ dense fasciculatæ, fuligineo-cinereæ, septulatæ, non v. vix ramosæ, sursum nodulosæ; conidia e nodulis oriunda, ovoidea, 8–9 \times 6, subhyalina. — *B. vulgari* affinis.
1523. **Sporotrichum flavo-virens** Link. Spec. pl. VI.

p. I. 17. — In ramis corticatis quercinis putrescentibus. **R.** (346). — Hyphæ breviusculæ, parce ramulosæ, in cæspitulos minutos flavo-virentes collectæ; conidia acrogena globosa, 3 mier. d., flavo-olivacea, 1-guttulata.

1524. **Sporotrichum merdarium** Link. Speg. pl. VI. p. 1. 10. — In excrementis humanis. **R.** (231). Cæspituli flavissimi, subpulveracei; hypharum ramuli saepe trifidi, subasperuli; conidia globosa, 9–10 mier. diam., muriculata, flava.

1525. **Sporotrichum grisellum** Sacc. Effusum velutinum, pallide griseum, denique pulveraceum; hyphis repentibus parce ramosis, subcontinuis, fertilibus assurgentibus, subsimplicibus v. breve et parce ramulosis, continuis, 40–60 = 2, pallide griseo-olivascentibus, sursum nodulosis; conidiis acro-pleurogenis, sphæricis, 3 micr. d. concoloribus, 1-guttulatis. — In ramis corticatis putrescentibus Ulicis Europæi. **B.** (133).

1526. **Nematogonium aurantiacum** Desm. In cortice udo Platani orientalis. **R.** (124).

1527. **Spicaria elegans** (Corda) Harz. In culmo Sorglii putrescente. **R.** (263). — Rami subverticillati, apice saepius 3-ramulosi; conidia catenulata, subbellipsoidea, 3–4 = 1 $\frac{1}{3}$, –2, hyalina. Cæspituli candidi, dein pulvrenulti.

1528. **Penicillium glaucum** Link. In caulis, corticibus etc. putridis. **R.** (252). **T.** (4937). — *versicolor. In subere putri. **T.** (4399).

1529. **Aspergillus glaucus** (Luin.) Link. In fructibus putridis &c. **R.** (30).

1530. **Trichoderma viride** Pers. In cortice quercino putri. **R.** (347).

1531. **Monilia sitophila** (Mont.) Sacc. *Penicillium sitophilum* Mont. Syll. 301. *Oidium aurantiacum* Lév. ex Mont. — In medulla panis corrupti, Lyon. **T.** (5090, specimina pulcherrima). — Hypha primaria ex mycelio repente assurgens, 120–130 = 12, parce septato-constricta, sursum in ramos bis dichotomos divisa; rami ramulique crassiusculi, crebre septati et facile se-

cedentes; conidia acrogena, breve concatenata, globosa 10–12 micr. diam., basi distinete apiculata, indeque isthmico-conjuncta. Tota plantula cæspitulos effusos amœne roseo-aurantiacos efformat.

Didymosporæ

1532. **Didymaria Ungeri** Corda. *Ramularia didyma* Ung. In foliis Ranunculi repentis. **L.** (1383).
1533. **Bostrichonema alpestre** Ces. Erbar. critt. ital. n.^o 149. — In pag. inferiore foliorum *Polygoni Bistortæ* in horto botanico *Lyon*, Oct. 1880. **T.** (5334). — Hyphæ cæspitulosæ, fasciculatæ, candidæ, eximie spiraliter flexæ, 130–140 × 5–6, deorsum parco septatæ, non constrictæ, sursum subattenuatæ; conidia acrogena (et pleurogena?) ellipsoidea diu continua, denique I-septata, leniter constricta, 20–22 × 14–15, mucilosa, hyalina, e latere curvula. — Genus pulchellum præcipue hyphis spiralibus a *Didymaria* diversum.

Phragmosporæ

1534. **Ramularia Ulmariæ** Cooke Grev. IV. 109. In pagina inferiore foliorum *Spirææ Ulmariæ*. **L.** (1372). — Hyphæ fasciculatæ simplices v. raro brevissime ramulosæ, parce septulatæ 30–50 × 4, hyalinæ; conidia cylindracea diu continua, denique I-septata, 25 × 5, hyalinae.
1535. **Ramularia gibba** Fuck. In foliis *Ranunculi auricomii*. **L.** (1368). — Conidia 18–20 × 3, plerunque continua; hyphæ brevissimæ, continuæ, 20–25 × 3, hyalinæ.

Dematiæ

MICRONEMÆ

Amerosporæ

1536. **Coniosporium socium** Sacc. & Roum. Cæspitulis hypophyllis, minutis, nigris; conidiis globulosis, 8 micr.

d., basi breve apiculatis, olivaceo-fuligineis, guttulatis. In foliis quercinis Aubenas (*Ardèche*). **T.** — Forte status micro-conidicus *Cookellæ microscopicae* Sacc.

1537. **Coniosporium Ananassæ** (Zimm.) Sacc. **F. G.**
738 (*Gymnosporium*). — In pag. inferiore foliorum
Ananassæ sativæ, *Marseille*. **R.**

1538. **Echinobotryum atrum** Corda. In cortice interiore populino putrescente **T.** (4925. 4977) socio *Stysano Stemonite*. — Conidia obpyriformia, sursum subrostellata, 10–12 ≈ 7–8, verruculosa, fusca, apice pallidiora.

Didymosporæ

1539. **Bispora monilioides** Corda ***condensata** Corda
F. G. 737. — In ligno fagineo putri ubi tapetum latum velutinum nigrum format; conidia 20–30 ≈ 8, aterrima.

Phragmosporæ

1540. **Septonema obscurum** Berk. & Br. Grev. 1874 p. 15. — In ligno putri. **B.** (144). — Cæspituli minutí atri; hyphopodia teretiuscula, continua, brevia; conidia catenulata tereti-fusoidea, 1–3-septata, 14 ≈ 4, lenissime constricta, fuliginea.

1541. **Closterosporium Therryanum** Sacc. & Roum. Effusum, nigrum, subpulveraceum; conidiis cylindraceis, utrinque rotundatis, bisepztatis, non constrictis, 3–4-guttulatis, 20 ≈ 4, fuligineis, basidiis paulo brevioribus subfasciculatis initio suffultis. — In cortice interiore *Alianthi glandulosæ* in horto botanico *Lyon*, hieme 1879. **T.**

1542. **Gyroceras Celtidis** Mont. & Ces. In pag. infer. foliorum *Celtidis australis*, *Algeria*, Julio 1880, TRABUT (18).

Dictyosporæ

1543. **Sirodesmium granulosum** DNtrs. nec Mich. II.

290 *). — In ligno abietino putri. **R.** (292). — Conidia catenulata tereti-oblonga, extus granuloso-muriculata, 28–38 × 10–15, muriformi-triseptata, olivaceo-fuliginea.

MACRONEMEÆ

Amerosporæ

1544. **Stachybotrys lobulata** B. & Br. In charta bibula putrescente. **T.** (4392). — Conidia ellipsoidea, 8–9 × 7, fusca, denique distincte verruculosa. *Icon.* in Roum. Rev. Mycol. pl. IX. fig. 4 non ad hanc speciem sed ad *St. atram* Corda spectat.
1545. **Zygodesmus fulvus** Sacc. Michel. II. 147. In foliis putrescentibus quercinis. **T.** (5288).
1546. **Zygodesmus nodosus** Pr. Hoyersw. II. 74. ***versiformis**: effusus, ater; hyphis nodulosis hyalinis, hinc inde ad nodos refracto-septatis; conidiis ellipsoideis, rugulosis, 26–28 × 20–26, atris, siccis complicatis et tunc subnavicularibus. — In ligno vetusto decorticato prope *Le Sapey* (*Isère*) Junio 1879. **T.**
1547. **Trichosporium nigricans** Sacc. Mich. II. 125. f. **lignicola**. In ligno putri, socia *Hypocrea rigente*. **T.** (5268). — A typo differt conidiis paulo majoribus, nempe 10–12 micr. diam. æque nigricantibus guttulatisque.
1548. **Hadrotrichum Phragmitis** Fuck. In foliis languidis *Phragmites communis*. **T.** (5278). — Hyphopodia dense fasciculata, 25–35 × 12 fuliginea;

*) *Sirodesmia veneta* sic distinguenda:

- Sirodesmium antiquum** Sacc. *Sir. granulosum* Sacc. Mich. II. 290. nec DNtrs. — Caespitulus gregariis, atris; conidiis fasciculatis teretiusculis, utrinque rotundatis, catenulatis et interdum ramoso-catenulatis, 100–150 × 24, dense clathrato-septatis, extus leviusculis, fuligineis, hyphopodiis brevissimis et angustis, concoloribus, suffultis. — In ligno *Oleæ europeæ*, *Torreglia*, Apr. 1875. — Affine *Sporodesmia antiquo* Corda, a quo statim dignoscitur conidiis concatenatis. Sed *Spor. antiquum* Corda *Icon.* III. fig. 11 hue p. p. spectat.
- Sirodesmium granulosum** DNtrs. In ligno quercino, *Possagno*, æstate 1879. Conidia ut supra descripta.

conidia solitariae acrogena, globulosa, basi brevissime apiculata, 15 micr. d., concoloria.

1549. **Sporodum conopleoides** Corda. In foliis putrescentibus Arundinis Donacis. **R.** (153). — Conidia globosa, 12–14, ochraceo-fuliginea denique minute asperula.

1550. **Hormodendron cladosporioides** (Fres.) Sacc. Mich. II. 148. *Acrostalagmus murinus*. **F. G.** 529 non Ces. — In caule interiore Phytolaccæ decandriæ, *Perpignan*, Febr. 1879. — A typo differt mycelio magis evoluto, an e situ clauso?

1551. **Circinotrichum maculiforme** Nees. In foliis putridis Magnoliæ grandifloræ. **R.** (147).

Didymosporæ

1552. **Cladotrichum Roumeguéri** Speg. Rev. Mycol. t. I. 148. **F. G.** 756. — In cortice Nerii Oleanderi, *Marseille* et *Perpignan*, RIVE, DEBEAUX.

1553. **Passalora bacilligera** (Mont.) Fr. In pag. inferiore foliorum Alni glutinosæ, socia *Sphærella* immatura. **T.** (5256).

1554. **Scolecotrichum graminis** Fuck. Symb. p. 107. *Azosma Punctum* Lacr. **F. G.** 740. *Passalora dactylina* Pass. Erb. critt. it. Ser. II. n.º 990. — In foliis arescendo ochraceo-maculatis Alopecuri geniculati, *Angers*, Doct. GUEPIN. — Hyphæ in fasciculum punctiforme dense aggregatæ, filiformes, simplices, sinuosæ, 90–100 × 8, subcontinuæ, fuligineæ; conidia acro-pleurogena, fusoideo-obclavata, 35–38 × 10, uniseptata, olivaceo-fusca. A genere affini *Fusicladio*, conidiis etiam pleurogenis differt.

1555. **Gladosporium compactum** Sacc. ***punctatum**: acervulis gregariis punctiformibus; hyphis brevibus subcontinuis, 30 × 4; conidiis acrogenis oblongis, 25 × 2, sæpius continuis, olivaceis. — In ramulis *Erythronium japonici*. **Mb.** (119).

Pragmosporæ

1556. **Helminthosporium arundinaceum** Corda. In

foliis languidis *Phragmitis communis*, ubi maculas valde extensas velutinas, atro—olivaceas format. **T.** (5041. 5041^{bis}). — *Hypopodia teretia* basi incrassata, 1—2—septata, 50—60 × 8, olivacea; conidia obclavata 40—45 × 18, plerumque biseptata, e hyalino olivacea.

1557. ***Helminthosporium leptosporum*** Sacc. & Roum.
Laxe effusum, atrum; conidiis obclavatis, 45 × 6—7 $\frac{1}{2}$, sursum attenuatis, 8—9—septatis, fuligineis apicem versus pallidioribus, hyphis paulo brevioribus teretibus, septulatis, fuligineis suffultis. — In cortice *Populi nigrae*, socia *Botryte gemella*, prope Lyon, aut. 1879. **T.** — Affine *Helminthosporio obclavato* Sacc. sed multo minus et tenerius.

1558. ***Heterosporium echinulatum*** (B. & Br.) Cooke.
In foliis languidis vel emortuis *Iridis germanicae*. **R.** (52. 338). — Hyphæ crassæ, septulatæ, sursum nodulosæ; conidia tereti—oblonga, 40 × 20, saepius 2—septata atque constricta, distincte muriculata.

Scolecosporæ

1559. ***Cercospora cana*** Sacc. In foliis *Erigeron-tis canadensis*, Lyon. **T.** (5131), Rouen. **L.** (1375).
1560. ***Cercospora olivascens*** Sacc. Michel. I. 268 (1878). *C. Aristolochiae* Roum. (1880). **F. G.** 757.
In foliis *Aristolochiae longae*, Perpignan.
1561. ***Cercospora Chenopodii*** Fres. Beitr. p. 92. In foliis nondum emortuis *Chenopodii albi*. **T.** (5239), **L.** (1385). — Hyphæ fasciculatæ, subbacillares, simplices, continuæ vel 1—septatæ, 40—45 × 5—6, fuligineæ; conidia aerogena tereti—fusoidea, utrinque obtusiuscula, 60—70 × 8—10, lenissime curva, 4—5—septata, nubilosa, hyalina.
1562. ***Cercospora smilacina*** Sacc. **F. G.** 723 (*Sep-toria smilacina*). — Maculis amphigenis, subcircularibus, rubellis, fusco—marginatis; hyphis in cæspitulos gregarios punctiformes atros collectis, filiformibus, 40 × 3 $\frac{1}{2}$, subdenticulatis, parcissime septatis, fuligineis;

conidiis acro-pleurogenis, anguste fusoideis, sursum acutioribus, 50-70 \times 5, spurie 2-3-septatis, olivaceis.

— In foliis languidis *Smilacis asperæ*, *Collioure*, O. DEBEAUX. — *Cerc. Smilacis* Thüm. Hedw. 1880 p. 135 hyphis crassis, conidiis hyalinis pluriseptatis differre videtur.

1563. ***Cercospora Malvarum*** Sacc. Maculis amphigenis olivaceis, nervis limitatis; hyphis in cæspitulos gregarios punctiformes, olivaceos collectis, filiformibus, septatis, 180-220 \times 4-5, parce nodulosis, olivaceis; conidiis filiformibus, sursum acutioribus, 3-5-septulatis, leniter curvis, 120-130 \times 3 $\frac{1}{2}$ -4, acro-pleurogenis, prorsus hyalinis. — In foliis nondum emortuis *Malvæ moschatæ*, près *Rouen*. L. (1371). — Maculis angulatis olivaceis a *Cerc. althæina* Sacc. in primis dignoscenda.

Dictyosporæ

1564. ***Mystrosporium pyriforme*** Desm. F. G. 755. In caulibus *Eryngii campestris*, DESMAZIERES, *Rouen Mb.* (137). — Hyphopodia teretia, parce septata, 40-60 \times 10, fuliginea, e basi stromatica cellulari fusca nascentia; conidia acrogena obpyriformia, 45 \times 18, triquadri-septato-muriformia, concoloria.

1665. ***Macrosporium fasciculatum*** Cooke & Ellis. In caule putri *Jatrophæ Janiphæ*. R. (361).

Tubercularieæ

TUBERCULARIEÆ MUCEDINEÆ

Amerosporæ

- (1059). ***Hymenula rubella*** Fr., Corda Icon.! In culmo putri *Phragmitis communis*. T. (5343). — Basidia acicularia, quandoque furcata, 20-25 \times 1; conidia acrogena cylindracea, utrinque obtusiuscula, recta curvulave, 5 $\frac{1}{2}$ -6 $\frac{1}{2}$ \times 1 $\frac{1}{2}$, 2-guttulata, hyalina. — Sporodochia oblonga, nitidula, flava, (forte initio rubella). *Dacryomyces Phragmitis* West., Kx. Fl. II. 115 verisimiliter hoc spectat.

1566. **Psilonia Arundinis** Desm. (*Chloridium Festucæ*
Corda hue relatum in Cooke Hndb. 624, differt coni-
diis dimidio et ultra minoribus. Cfr. Corda Icon. III.
p. 7). — In vaginis Phragmitis communis putridis,
Lyon, Junio 1880. **T.** (5017). — Acervuli denique
expansi, rosei, setulis anguste filiformibus, 150 ~ 1, con-
tinuis hyalinis interseminati; conidia fusoidea, curvula,
15–18 ~ 3, quadriguttulata, hyalina, basidiis bacillari-
bus, 15 ~ 2, fasciculatis suffulta.
1567. **Psilonia pellicula** Desm. **F. G.** 638. In foliis
Laricum putrescentibus. **Lb.** — Conidia cylindracea,
lenissime curva, 5–6 ~ $\frac{1}{2}$, basidiis filiformibus sesqui-
longioribus suffulta. An, setulis deficientibus, potius *Hy-
menulæ* species?
1568. **Volutella ciliata** (A. S.) Fr. In ramis putridis
Gleditschiæ &c. **T.** (4998). — Est forma pul-
chella longiuscula stipitata.
1569. **Volutella gilva** (Pers.) Sacc. Mich. II. 298. *Psi-
lonia gilva* Fr. **F. G.** 761. — In caulinis *Veronicæ*
longifoliae emortuis, *Angers*, GUEPIN.

Phragmosporæ

1570. **Fusarium violaceum** Fuck. **F. G.** 635. — In
tuberibus *Solani tuberosi*. **Lb.**

TUBERCULARIÆ DEMATIÆ

Amerosporæ

1571. **Epicoccum purpurascens** Ehrb. In ramulis *Ro-
biniae*, inque foliis *Sorghii*. **Mb.** (178). **R.** (314).
1572. **Epicoccum nigrum** Link. v. *agyrioides* Cor-
da. In ligno pineo aqua diu submerso. **R.** (31). —
Conidia sphæroidea, pallidius apiculata, 15 micr. diam.
atrofuliginea, rugoso-reticulata.
1573. **Myrothecium ellipsosporum** Fuck. In foliis
putrescentibus *Phragmitis communis*. **R.** (33.
195). — Videretur *Chaetostroma*, sed setæ nullæ;
conidia fusoidea, 12–14 ~ 3, olivacea.

1574. **Myrothecium trochiloides** Sacc. Sporodochiiis gregariis, suberumpentibus, disciformibus, nigris, $\frac{1}{3}$ mill. d. calvis; conidiis anguste fusoideis, leniter curvis, 8-10 = 2-2 $\frac{1}{2}$, utrinque 1-guttulatis et acutiusculis, e hyalino olivaceis, basidiis dense fasciculatis filiformibus, interdum furcatis, 30-40 = 1 $\frac{1}{2}$, olivaceis suffultis. — In vaginis Phragmitis communis emortuis. **T.** (5200).

STILBEEÆ

Hyalostilbeæ

1575. **Isaria filiformis** Wallr., * **cladogena**: filiformi-clavulata, candida, simplex $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ mill. alta, sursum ob sporophora patula, apicem versus acutata asperula; conidiis globosis 3-4 micr. d. hyalinis v. dilutissime fumosis, saepius 1-guttulatis. — In caulis Alter-nantheræ purpureæ putrescentibus, Lyon, in calidariis, Apr. 1880. **T.** (4837).

1576. **Isaria farinosa** (Diks.) Fr. * **prolifero-ramosa**. In larvis insectorum, Lyon. **T.** (5199).

1577. **Isaria felina** Fr. **G. F.** 753. In stercore felino, socio *Mucore Phycomycete* in cryptis, *Paris*, legit **ME-RAT**, comm. **FEUILLAUBOIS**.

1578. **Isaria sulfurea** Fiedl. in Rabh. F. E. n.^o 60 (non vidi). — In terra stercorata et in exrementis mammiferorum. **R.** (414). — Stromata gregaria, clavata, pallide sulfurea; stipes ex hyphis longitudinalibus transversisque filiformibus conflatus; conidia ex denticulis hypharum superiorum varie ramosarum, 4-6 micr. d., e hyalino flavidarum subpleurogena, globulosa, coloria, 5-6 micr. d. granulosa. — Huc forte quoque spectat *Coremium citrinum* Pers. Stirps vero ob contextum intricatum stromatis, nec vere fasciculatum, tam ab *Isaria* quam a *Coremio* deflectit.

1579. **Roeslaria pallida** (Pers.) Sacc. Rev. Mycol. 1881 p. 2 pl. XI. fig. 1-9. Mich. II. 299, ubi jam addidi synonymon *Sphinctrina coremioides* B. & Br. Grev. II. 165 (et sec. exempl. cl. PHILLIPSII a cl. ROUME-

GUÈRE communicata). — In radicibus emortuis v. languentibus *Vitis viniferæ*, usque ad profunditatem metr. 1, *Rougeon, près de Buxy (Saône & Loire)*, X. GILLOT & OZANON.

Phæostilbeæ

1580. **Stysanus Stemonitis** (Pers.) Corda. In cortice interiore populinæ, socio *Echinobotryo*. **T.** (4925. 4977). — Conidia 8 ~ 5.
1581. **Stysanus microsporus** Sacc. In cortice interiore populinæ. **T.** (5138). — Conidia 4 ~ 2-2 $\frac{1}{2}$.
1582. **Stysanus parasiticus** Desm. Ann. Sc. nat. 3. X. p. 344. *St. sphæriæformis* Auersw. Myc. Eur. t. 11 fig. 149. *Sphæria Ariæ* DC. **F. G.** 790. — In foliis emortuis *Pyri Ariæ*, *Dreispitz*, NESTLER.
1583. **Graphium fasciculatum** Sacc. In ramis Rhois putrescentibus, socia *Eutypa heteracantha*, Montpellier. **R.** (40).
1584. **Arthrobotryum camptosporum** Sacc. & Therr. Stipitibus superficialibus, gregariis, teretiusculis, 150 ~ 20, dilute ochraceis, ex hyphis filiformibus continuis coalitis formatis; conidiis capitatis ex hypharum apice relaxato oriundis, tereti-fusoideis, curvulis 15 ~ 4, utrinque obtusiusculis, 4-guttatis, spuriee 3-septatis, dilutissime olivaceis. — In laminis librosis Populi emortuae, Junio 1880. **T.** (4993). — Ab affini *Arthr. stilboide* Ces. differt conidiis curvis, obtusioribus, 4-guttulatis.

Mycelia

1585. **Asteroma reticulatum** (DC.) Chev. ***Eryngii**. In foliis Eryngii campestris. **R.** (368).
1586. **Asteroma Medusula** Dur. & Mont. In caule emortuo Ferulaginis nodifloræ. **R.** (258).
1587. **Asteroma Robergei** Desm. **F. G.** 633. In medulla Heraclei Sphondylii, DESMAZIERES.
1588. **Asteroma Ulmi** Desm. **F. G.** 632. In foliis lanioidis Ulmi campestris, *Lozère*, PROST.

1589. **Asteroma vagans** Desm. ***A. frigidum**. Fibrillis radiantibus copiosis, tenuibus, maculas subcirculares 2-4 mill. d., cinereo-nigricantes amphigenas efficientibus; peritheciis (vacuis) intermixtis, punctiformibus. — In foliis hieme frigidissimo 1879-80 necatis *Eponymi japonici*. **Mb.** (118). — Frequens quoque innotuit *Padova, Treviso, Firenze* eodem tempore.
1590. **Asteroma Bupleuri** Sacc. & Roum. Amphigenum maculas latas piceas subcontinuas efformans; peritheciis cerebrimis, lenticularibus 80 micr. diam. (vacuis), hyphulis fuligineis conjunctis. — In foliis *Bupleuri rigidii, Lozieres (Gard)*, aut. 1878. **T.** — Status *Sphaerellae*.
1591. **Pirostoma circinans** Fr. ? — In vaginis *Phragmitis communis* emortuis, immaturum ergo dubium. **R.** (47).
1592. **Microsticta vagans** Desm. ***Buxi**. **F. G.** 674 (*Perisporium*). — In pag. inf. foliorum nondum emortuorum *Buxi sempervirentis*, près de *Limoges*, E. LAMY. — Fere absque dubio sistit incunabula *Microthyrii microscopici*.
1593. **Ectostroma Iridis** (Ehrenb.) Fr. **F. G.** 716 (*Leptostroma*). — In foliis *Iridis Pseudo-acori, Lozère, Prost.*
1594. **Sclerotium Convallariæ** Lib. **F. G.** 682. — In foliis delapsis *Convallariæ verticillatae*. **Lb.**
1595. **Sclerotium inconspicuum** Lib. **F. G.** 681. — In squamis bulborum *Allii Cæpæ*. **Lb.**
1596. **Sclerotium Semen** Tode. In caule putri *Brasicæ oleraceæ*. **L.** (128·9)
1597. **Sclerotium Clavus** DC. **F. G.** 598 (*Spermædia*) In glumis *Secalis*. **M.** — *Scl. tectum*. **F. G.** 578 potius formam immaturam *Phomæ (Diaporthis)* cuius-dam refert.
1598. **Rhacodium Therryanum** Thüm. Inter acus *Abietis* putrescentes. **R.** (164).
1599. **Rhacodium cellare** Fr. **F. G.** 599 (*Zasmidium*). Ad dolia uda in cellis. **M.** — Adsunt hinc inde inter hyphas sphærulæ nitidulæ $\frac{1}{2}$ mill. d., satis fragi-

les a nonnullis mycologis tamquam perithecia sumptae; sed (microscopice exploratae) nil sunt nisi glomeruli ex hyphis elongatis varie et dense contexti, sporis omnino carentes.

1600. **Hypha speciosa** Humb. **F. G.** 597 (nec, ut videtur, *H. flabellata* Pers.). — In ligno abietino carioso, *Bagnères de Luchon*. **R.**
1601. **Himantia helvola** Pers. *Mycol. Eur.* I. p. 90. — In cortice interiore putrescente Populi putris, *Lyon*, Nov. 1880. **T.** (5273).
1602. **Rhizomorpha discreta** Pers. **F. G.** 799. — In interiore ligno Salicis putri, *Jura*, CHAILLET.
1603. **Rhizomorpha subterranea** Pers. **F. G.** 798
In lignis corruptis in cryptis, *Autun*, X. GILLOT.
R. putealis Pers., saltē ex exempl. **M.** in **F. G.** 697 nil est nisi cæspitulus caudiculorum musci cuiusdam hydrophili (prob. *Cinclidotii*) foliis denique (præcipue ab aqua ruente) spoliati!

Cæcidia

1604. **Erineum Rubi** Kunze. In foliis languidis Rubi fruticosi amphigenum. **L.** (1448).
1605. **Erineum bifrons** Fee. **F. G.** 699. In foliis Tiliæ europeæ, epiphyllum. **M.**
1606. **Erineum juglandinum** Pers. **F. G.** 700. In foliis Juglandis regiæ, hypophyllum, NESTLER.
1607. **Erineum pyrinum** Pers. **F. G.** 698. In foliis Pyri communis, *Lille*, DESMAZIERES.

SPECIES ADDENDÆ

1608. **Uromyces Laburni** (DC.) Fuck. In foliis Cytisi Laburni, *Arnas*, GANDOGER.
1609. **Uromyces striatus** Schröt. In foliis Medicaginis sativæ, *Arnas*, GANDOGER.

1610. **Uromyces Betæ** (Pers.) Kühn. In foliis Betæ Cyclæ, *Arnas*, GANDOGER.
1611. **Puccinia Lychnidearum** Link. In foliis Sile-nes nutantis, *Arnas*, GANDOGER.
1612. **Puccinia Balsamitæ** Rabh. In foliis Tanaceti Balsamitæ, *Arnas*, GANDOGER.
1613. **Puccinia Oreoselini** (Str.) Fuck. In foliis Pe-u-cedani Cervariæ, *Arnas*, GANDOGER.
1614. **Phragmidium obtusum** K. S. In foliis Poten-tillæ vernæ, *Gleizè*, GANDOGER.
1615. **Æcidium Ferulæ** Rouss. & Dur. In foliis Fe-rularum, *Algeria*, TRABUT (21).
1616. **Uredo Fici** Cast. In foliis Fici Caricæ, *Alger*, TRABUT (8).
1617. **Lycoperdon hiemale** Bull. Ad terram *Alger*, TRA-BUT (6).
1618. **Microthyrium Smilacis** DNtrs. In caulis Smi-lacis, *Algeria*, TRABUT (15). — Asci ovoidei 38 ~ 28, sessiles; sporidia octona conglobata, ellipsoidea v. sub-ovoidea, 12–14 ~ 8–10, granulosa, hyalina. Contextus peritheciæ distinctissime radiato—parenchymaticus, fuligineus.
1619. **Coniothyrium Halymi** (Cast.) Sacc. **F. G.** 163 (*Fusisporium Halymi*), *Sphæria Halymi* Cast. — Pe-ritheciis dense gregariis, innato—erumpentibus, amphi-genis globoso—lenticularibus, vix 100–110 micr. diam., poro pertusis, contextu distincte parenchymatico fuligi-neo—olivaceo; spermatis globosis, 5–6 micr. diam. di-lute fuligineis, guttulâ subroseâ foetis. — In foliis A-triplicis Halymi languidis, *Angers*, GUEPIN.
1620. **Vermicularia maculans** (Link.) Desm. **F. G.** 754 (*Exosporium*). — In caulis Urtice urentis emortuæ. **M.**

